膠原病											
レジメン名 リツキシマブ(多発血管炎性肉芽腫症・顕微鏡的					]多発血管炎) 癌剂		癌種		多発血管炎		
解	多発血管	<b>企業の企業を表現しています。                                    </b>		1コース			内服・				
説	標的治療			7	日						
備	リツキシ	ソキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソ		催吐!	ノスク						
考	プロスト	ール・クロルフ	ユニラ	ミン)を行う。	最	小人					
		薬剤名		投与量				手技		投与スケシ	<b>ジュール</b>
リツ	ノキシマフ	,,		375mg/mੈ		2-3時	間で点滴	j		day1	
				プローン病、潰瘍性大腸炎)			癌種		クローン病・		
	クローン	柄、 <u>演</u> 腸性大腸	一般に対	する抗体療法の1つ。	1	ース			内服・そ	その他内容	
説	加同北上	後 つ油 6年	1/-+ル片	し、以後8週間隔で投与を	/対U+ I	ノスク					
	が凹投 <del>す</del> 行う。	<b>伎、 Z <u>旭</u>、 D </b> 應	alc1Z <del>-)</del>	し、以後の週间隔に投一で		リヘン 切い	ŀ				
75	11 7 0				月又	,),		 手技		投与スケシ	5¬ — Ⅱ.
イン	ノフリキシ			5mg/kg		120分	で点滴	丁汉		day1,15,43,99	
	7 7 1 7			3111g/ kg		120)	CMM			day1,13,13,33	
レシ	ジメン名	ベリムマブ(9	SLE)				癌種		全身性エリテ <sup>・</sup>	マトーデス	
解	既存治療	で効果不十分な	全身性	エリテマトーデス	1⊐	ース			内服・そ	その他内容	
説					14	1日	]				
	4サイクル	レ目以降4週間で	で投与		催吐リスク						
考					最	小人					
		薬剤名		投与量				手技		投与スケシ	ブユール 
ベリ	ルマブ			10mg/kg		60分で	で点滴			day1	
_ ~	**.1> /2	L > 113""	/4+ <i>5</i> %.h	4.8825/JJ - P   370/2	\		広廷		## <b>2</b> %## 88 <i>6</i> 25 /J/	- ナーフィル店	<b>-</b>
	メン名			<b>生関節炎、成人スチル病、キャッスル</b> キャッスルマン病	1	7	癌種			、成人スチル病、	キャッスル
<b>胜</b> 説	付先注例	即災、成人人ナ	プレが入、	<b>キャッスルマン</b> 柄		ース <del>1</del> 日			八服・で	その他内容	
	症状に応	 じ7日に短縮可í	能			<u>'ロ</u> Jスク					
考	, III / / ( C / ( C / ( C		DC.			小 小					
					HX			手技		投与スケシ	ブフ <i>ー</i> ル
トシ	ノリズマフ			8mg/kg		60分で	"点滴	- J J Z		day1	
				- Ji . · · ·			_ , , , , ,				

		(治療抵抗性リウマチ性疾患			癌種	治療抵抗性リ	ウマチ性疾患	
	性リウマチ性疾患に使	用する。		ース		内服・る	その他内容	
説				28日				
備				ノスク				
考			Ę	<del> </del>				
> <del>-</del>	薬剤名	投与量		100()	手技		投与スケジュール	
シクロホスフ	ファミド	750mg/m²		180分	で点滴		day1	
レジメン名	トシリズマブ(関節	しつつよ)			癌種	関節リウマチ		
			17.	1コース 内服・その他内容				
説	既存治療で効果不十分な関節リウマチ			<u></u>		י אומניז	בייטוטיזם	
備				ノスク				
考			最	<u>:/</u> ]\				
	薬剤名	投与量			手技		投与スケジュール	
トシリズマス	J'	8mg/kg		60分で	で点滴		day1	
レジメン名	アバタセプト(関節				癌種	関節リウマチ		
	で効果不十分な関節リ	ウマチ		ース 8日		内服・そ	その他内容	
説 初回投与	後、2週、4週に投与し	. 以後4週問隔		リスク				
考		7、以及于四间隔		·小				
	薬剤名	投与量	ΑX		L		投与スケジュール	
アバタセプト		60kg未満:500mg		30分で			day1,15,29,57···	
		60-100kg : 750mg						
		100kg異常:1000mg						
	インフリキシマブ(				癌種 関節リウマチ			
	で効果不十分な関節リ	ウマチ	1コース		内服・その他内容			
説如同地上				5日			重1kg当たりの投与量の上限	
	初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間隔			リスク		LOmg、投与間隔を短縮した場た、最短の投与間隔は4週間		
考		投与量	取	·小	手技	ngcyる。ま		
インフリキシ		授 <del>与</del> 重 3-10mg/kg		120分	で点滴		投与スケジュール day1,15,43,99…	
コンフラテン		D-10mg/kg		120)	こ 無 周		uay1,15,45,55	
レジメン名	インフリキシマブ(「			癌種	関節症性乾癬			
解既存治療で効果不十分な関節症性乾癬				ース				
説					6週の投与以後、1回の体重1kg当たりの投与量の上限			
	備 初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間隔			Jスク	は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した			
考			最	<u></u> 小	合であれば6r	mgとする。ま	た、最短の投与間隔は4週間	
	薬剤名	投与量			手技		投与スケジュール	
インフリキシ	レマブ	5-10mg/kg		120分	で点滴		day1,15,43,99…	
		1						

レジメン名 <b>インフリキシマブ</b> (	<b>強直性脊椎炎)</b>	癌種 <u>強直性脊椎炎</u>			
解 既存治療 で効果不十分な強直性	1⊐.	ース	内服・る	・その他内容	
説	説				
備 初回投与後、2週、6週に投与し	催吐!	Jスク			
考			小		
				手技	投与スケジュール
インフリキシマブ 5mg/kg		120分		で点滴	day1,15,43,99…