

# 副作用症状確認表

お名前

治療日

- ・治療が終了した日から、次回治療日まで下記のような症状があった場合記録してください。
- ・副作用症状確認表は、1.診察時に主治医へ症状を伝えるとき 2.通院治療センター看護師が症状を確認するときにお見せください。

症状の程度	0	1	日にち	2	日にち	3	日にち
吐き気	無	食欲は無いが食べられる 軽いむかつきはある		普段より食事量が半分以下や体重が減った		ごはんが食べられない	
嘔吐	無	嘔吐はあったが、吐き気止めは飲んでいない		外来で点滴治療をした。もしくは頓服の吐き気止めは使用した		入院して点滴治療した	
食欲不振	無	食べてはいるが、食欲が無い		経口補助食品等、食事の内容を変えて食べている 量がかなり減った		栄養補助の水分しかとれていない 体重が減った	
口内炎	無	軽い痛みはあるが、食べられる 赤みあり		痛みはあるが、食べられる 食事の内容や形は変えて食べている		高度の痛みがあり、食べられない	
味覚異常	無	味の変化はあるが、食事内容は変わらない		味が無い 変な味になったので、食事内容が変わった			
疲労 (つかれ)	無	少し休むと楽になる		休んでも楽にならない 外出できない		常に横になっており、普通の生活ができない	
息苦しさ	無	歩行時息苦しい		普段の動作でも息苦しい		安静にしても息苦しい	
末梢神経 障害 (しびれ)	無	しびれや痛みは無いが、違和感を感じる		しびれがあり、動かしにくいが生活はできる ボタンがけや新聞はめくれる		痛みがあり、生活に支障が出る ボタンがけや新聞がめくりづらい 杖や車椅子を使用する	
下痢	無	1日で3回以下		1日で4~6回		1日で7回以上か、便失禁がある	
便秘	無	時々緩下剤の内服や浣腸をする		緩下剤や浣腸を定期的に使う		排便をして便を出した	
脱毛	無	少し抜けた 他人からはわからない.50%以下		かなり抜けて、他人もわかる 50%以上毛が抜けている			
皮膚障害	無	しびれ、ヒリヒリ・チクチク感や手の平 や足裏の赤み		ヒリヒリ・チクチク感があり 痛みを伴う皮膚の赤み		皮膚がはがれ落ち、ひび割れ、水ぶくれ 等や強い痛みがある 普通の生活ができない	
かゆみ	無	多少かゆみがある		かなり強いかゆみがある			
爪の障害	無	爪がかけたり、はがれるが、痛みはなし		爪がかけたり、はがれて、痛みがある 普通の生活ができない			

観察項目 (CTCA E v5.0・JCOGに基づいて)

その他に気になることがあれば、お書き下さい。



通院治療センター