XELOX 療法のスケジュールと主な副作用症状の出現時期

（　　）月（　　）日から治療開始です

＜腫瘍内科・外科用＞　　＜点滴時間＞

- 吐き気を予防する点滴　→　１５　分間
- エルプラット　→　１２０分間
- 生理食塩水　→　５　分間

合計　約　２時間２０分

- ゼローダ　内服薬　（朝・夕）

（　治療スケジュール：３週に１回の点滴です　）



近畿大学病院　通院治療センター　　説明者＿＿＿＿＿＿＿＿

主な副作用の対処方法

◎手足のしびれ：冷たい空気や物に触れると症状が出やすいため、冷たい食べ物や飲み物を避けましょう。
締め付けのない衣服を着て、入浴時はゆっくり温めましょう。
◎手足症候群：掌や足の裏に、赤みや腫れがみられます。
ひどくならないよう保湿して乾燥を防ぎましょう。
上記症状に関しては、詳しいパンフレットをお渡しします。

！ご自宅での注意点！

☆１日目（点滴の日）の夕から１５日目の朝まで内服があります。
☆飲み忘れに気づいた時に薬を飲んだり、２回分まとめて飲まないで下さい。余った薬は次の外来で主治医へ伝えて下さい。
（治療パンフレットのチェック表を使って、飲み忘れを防ぎましょう。）

以下の症状がある時は連絡をしてください。

☆３８度以上の熱
（抗生剤が処方されている場合は内服してください）
☆吐き気が強く、24 時間以上全く食事や水分が摂れない時
その他、対応に困った時は下記へ連絡してください。

☎　連絡先　０７２－３６６－０２２１

◎平日・土曜　→　受診している外来受付

◎日曜・祝日・診療時間外　→　診療科の当直医

診察券を準備のうえ、お名前・診療科・主治医氏名
通院治療センターで治療中であること、今の状態を伝えてください