

血液内科

| レジメン名     |  | CHOP (悪性リンパ腫) |          | 癌種       | 悪性リンパ腫 |  |
|-----------|--|---------------|----------|----------|--------|--|
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫に対する標準的化学療法。                            | 1コース          | 内服・その他内容 |          |        |  |
|           |  | 21日           |          |          |        |  |
| 備考        |  | 催吐リスク         |          |          |        |  |
|           |  | 高             |          |          |        |  |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技            |          | 投与スケジュール |        |  |
| ドキシソルビン   | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴        |          | day1     |        |  |
| シクロホスファミド | 750mg/m <sup>2</sup>                             | 120分で点滴       |          | day1     |        |  |
| ビンクリスチン   | 1.4mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴        |          | day1     |        |  |
| レジメン名     |  | R-ベンダムスチン     |          | 癌種       | 悪性リンパ腫 |  |
| 解説        | 高齢者における再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマンツル細胞に対する化学療法。     | 1コース          | 内服・その他内容 |          |        |  |
|           |  | 28日           |          |          |        |  |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク         |          |          |        |  |
|           |  | 中             |          |          |        |  |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技            |          | 投与スケジュール |        |  |
| リツキシマブ    | 375mg/m <sup>2</sup>                             | 2-3時間で点滴      |          | day1     |        |  |
| ベンダムスチン   | 120mg/m <sup>2</sup>                             | 60分で点滴        |          | day2,3   |        |  |
| レジメン名     |  | FCR (R後)      |          | 癌種       | 悪性リンパ腫 |  |
| 解説        | 悪性リンパ腫に対する治療法の1つ。                                | 1コース          | 内服・その他内容 |          |        |  |
|           |  | 28日           |          |          |        |  |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク         |          |          |        |  |
|           |  | 中             |          |          |        |  |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技            |          | 投与スケジュール |        |  |
| フルダラビン    | 25mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴        |          | day1-3   |        |  |
| シクロホスファミド | 1000mg/m <sup>2</sup>                            | 2時間で点滴        |          | day1     |        |  |
| リツキシマブ    | 375mg/m <sup>2</sup>                             | 2-3時間で点滴      |          | day4     |        |  |
| レジメン名     |  | GDP           |          | 癌種       | 悪性リンパ腫 |  |
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ種の救済療法の一つ。                      | 1コース          | 内服・その他内容 |          |        |  |
|           |  | 21日           |          |          |        |  |
| 備考        |  | 催吐リスク         |          |          |        |  |
|           |  | 高             |          |          |        |  |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技            |          | 投与スケジュール |        |  |
| ゲムシタビン    | 1000mg/m <sup>2</sup>                            | 30分で点滴        |          | day1,8   |        |  |
| シスプラチン    | 75mg/m <sup>2</sup>                              | 60分で点滴        |          | day1     |        |  |

|               |  |                               |                       |           |        |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| レジメン名         |  | FCR (R先)                      |                       | 癌種        | 悪性リンパ腫 |
| 解説            | 悪性リンパ腫に対する治療法の1つ。                                | 1コース                          | 内服・その他内容              |           |        |
|               |  | 28日                           |                       |           |        |
| 備考            | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク                         |                       |           |        |
|               |  | 中                             |                       |           |        |
| 薬剤名           |  | 投与量                           | 手技                    | 投与スケジュール  |        |
| リツキシマブ        |  | 375mg/m <sup>2</sup>          | 2-3時間で点滴              | day1      |        |
| フルダラビン        |  | 25mg/m <sup>2</sup>           | 30分で点滴                | day2-4    |        |
| シクロホスファミド     |  | 1000mg/m <sup>2</sup>         | 2時間で点滴                | day2      |        |
| レジメン名         |  | 大量MTX+Ara-C (中枢浸潤悪性リンパ腫)      |                       | 癌種        | 悪性リンパ腫 |
| 解説            | 中枢浸潤悪性リンパ腫のレジメン                                  | 1コース                          | 内服・その他内容              |           |        |
|               |  | 21日                           |                       |           |        |
| 備考            |  | 催吐リスク                         |                       |           |        |
|               |  | 中                             |                       |           |        |
| 薬剤名           |  | 投与量                           | 手技                    | 投与スケジュール  |        |
| メトトレキサート      |  | 500mg/m <sup>2</sup>          | 15分で点滴                | day1      |        |
| メトトレキサート      |  | 3000mg/m <sup>2</sup>         | 3時間で点滴                | day1      |        |
| シタラビン①        |  | 2000mg/m <sup>2</sup>         | 1時間で点滴                | day2,3    |        |
| シタラビン②        |  | 2000mg/m <sup>2</sup>         | 1時間で点滴<br>②は①と12時間空ける | day2,3    |        |
| レジメン名         |  | GEM (悪性リンパ腫)                  |                       | 癌種        | 悪性リンパ腫 |
| 解説            | 膵癌、胆癌、膀胱癌、卵巣癌、悪性リンパ腫に対する化学療法<br>の1つ。             | 1コース                          | 内服・その他内容              |           |        |
|               |  | 28日                           |                       |           |        |
| 備考            |  | 催吐リスク                         |                       |           |        |
|               |  | 軽                             |                       |           |        |
| 薬剤名           |  | 投与量                           | 手技                    | 投与スケジュール  |        |
| ゲムシタピン        |  | 1000mg/m <sup>2</sup>         | 30分で点滴                | day1,8,15 |        |
| レジメン名         |  | ブレンツキシマブ ベドチン                 |                       | 癌種        | 悪性リンパ腫 |
| 解説            | 再発または難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫および未分化大細胞リンパ腫             | 1コース                          | 内服・その他内容              |           |        |
|               |  | 21日                           |                       |           |        |
| 備考            |  | 催吐リスク                         |                       |           |        |
|               |  | 軽                             |                       |           |        |
| 薬剤名           |  | 投与量                           | 手技                    | 投与スケジュール  |        |
| ブレンツキシマブ ベドチン |  | 1.8mg/kg                      | 30分で点滴                | day1      |        |
| レジメン名         |  | MTX・ロイコボリン救援療法 (6hr) (悪性リンパ腫) |                       | 癌種        | 悪性リンパ腫 |
| 解説            | 急性白血病、悪性リンパ腫に対する治療法。                             | 1コース                          | 内服・その他内容              |           |        |
|               |  | 21日                           |                       |           |        |
| 備考            |  | 催吐リスク                         |                       |           |        |
|               |  | 中                             |                       |           |        |
| 薬剤名           |  | 投与量                           | 手技                    | 投与スケジュール  |        |
| メトトレキサート      |  | 3500mg/m <sup>2</sup>         | 6時間で点滴                | day1      |        |

| レジメン名     |  | 脳脊髄腔（腰椎）注射（悪性リンパ腫）   |  | 癌種                            | 悪性リンパ腫 |                                       |  |
|-----------|--|----------------------|--|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| 解説<br>備考  | 急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、悪性リンパ腫の標準的治療の1つ。              | 1コース                 |  | 内服・その他内容                      |        |                                       |  |
|           |  | 1                    |  |                               |        |                                       |  |
|           |  | 催吐リスク                |  |                               |        |                                       |  |
|           |  | 最小                   |  |                               |        |                                       |  |
| 薬剤名       |  | 投与量                  |  | 手技                            |        | 投与スケジュール                              |  |
| シタラピン     |  | 40mg/body            |  | 脳脊髄腔注                         |        | day1                                  |  |
| メトトレキサート  |  | 15mg/body            |  | 脳脊髄腔注                         |        | day1                                  |  |
| レジメン名     |  | R+レナリドミド             |  | 癌種                            | 悪性リンパ腫 |                                       |  |
| 解説<br>備考  | 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫に対する治療法の一つ。              | 1コース                 |  | 内服・その他内容                      |        |                                       |  |
|           |  | 28日                  |  | レナリドミド：20mg/body 経口分1 day1-21 |        |                                       |  |
|           |  | 催吐リスク                |  |                               |        |                                       |  |
|           | 6コース目以降レナリドミド単剤、最大12コース                          | 最小                   |  |                               |        |                                       |  |
| 薬剤名       |  | 投与量                  |  | 手技                            |        | 投与スケジュール                              |  |
| リツキシマブ    |  | 375mg/m <sup>2</sup> |  | 2-3時間で点滴                      |        | 1C目day1,8,15,22<br>2C目以降day1<br>C=コース |  |
| レジメン名     |  | THP-COP-E（悪性リンパ腫）    |  | 癌種                            | 悪性リンパ腫 |                                       |  |
| 解説<br>備考  | 高齢者における悪性リンパ腫に対する化学療法。                           | 1コース                 |  | 内服・その他内容                      |        |                                       |  |
|           |  | 21日                  |  |                               |        |                                       |  |
|           |  | 催吐リスク                |  |                               |        |                                       |  |
|           |  | 中                    |  |                               |        |                                       |  |
| 薬剤名       |  | 投与量                  |  | 手技                            |        | 投与スケジュール                              |  |
| ピラルピシン    |  | 30mg/m <sup>2</sup>  |  | 30分で点滴                        |        | day1                                  |  |
| シクロホスファミド |  | 500mg/m <sup>2</sup> |  | 120分で点滴                       |        | day1                                  |  |
| ビンクリスチン   |  | 1mg/m <sup>2</sup>   |  | 10分で点滴                        |        | day1                                  |  |
| エトポシド     |  | 80mg/m <sup>2</sup>  |  | 120分で点滴                       |        | day1                                  |  |
| レジメン名     |  | R-EPOCH（縦隔原発B細胞リンパ腫） |  | 癌種                            | 悪性リンパ腫 |                                       |  |
| 解説<br>備考  | 縦隔原発B細胞リンパ腫に対する治療法                               | 1コース                 |  | 内服・その他内容                      |        |                                       |  |
|           |  | 21日                  |  |                               |        |                                       |  |
|           |  | 催吐リスク                |  |                               |        |                                       |  |
|           | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 中                    |  |                               |        |                                       |  |
| 薬剤名       |  | 投与量                  |  | 手技                            |        | 投与スケジュール                              |  |
| リツキシマブ    |  | 375mg/m <sup>2</sup> |  | 2-3時間で点滴                      |        | day1                                  |  |
| エトポシド     |  | 50mg/m <sup>2</sup>  |  | 24時間で点滴                       |        | day2-5                                |  |
| ドキシソルピシン  |  | 10mg/m <sup>2</sup>  |  |                               |        |                                       |  |
| ビンクリスチン   |  | 0.4mg/m <sup>2</sup> |  |                               |        |                                       |  |
| シクロホスファミド |  | 750mg/m <sup>2</sup> |  | 2時間で点滴                        |        | day6                                  |  |
| レジメン名     |  | ベンダムスチン（悪性リンパ腫）      |  | 癌種                            | 悪性リンパ腫 |                                       |  |
| 解説<br>備考  | 再発難治性悪性リンパ腫に対する新規薬剤治療法。                          | 1コース                 |  | 内服・その他内容                      |        |                                       |  |
|           |  | 21日                  |  |                               |        |                                       |  |
|           |  | 催吐リスク                |  |                               |        |                                       |  |
|           |  | 中                    |  |                               |        |                                       |  |
| 薬剤名       |  | 投与量                  |  | 手技                            |        | 投与スケジュール                              |  |
| ベンダムスチン   |  | 120mg/m <sup>2</sup> |  | 1時間で点滴                        |        | day1,2                                |  |

| レジメン名   | CMD (CD20陽性悪性リンパ腫)   |  | 癌種                                   | 悪性リンパ腫 |
|---|--|--|--------------------------------------|--------|
| 解説<br>備考  | 悪性リンパ腫に対する化学療法。  | 1コース   | 内服・その他内容                             |        |
|   |  | 14日  |                                      |        |
|   | 催吐リスク  |  |                                      |        |
|   | 中  |  |                                      |        |
| 薬剤名   | 投与量  | 手技   | 投与スケジュール                             |        |
| イリノテカン<br>ミトキサントロン                                | 25mg/m <sup>2</sup><br>8mg/m <sup>2</sup>  | 90分で点滴<br>30分で点滴                                   | day1,2<br>day3                       |        |
| レジメン名   | CHASE (悪性リンパ腫)   |  | 癌種                                   | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考  | 再発・難治悪性リンパ腫の救済療法。  | 1コース   | 内服・その他内容                             |        |
|   |  | 21日  |                                      |        |
|   | 催吐リスク  |  |                                      |        |
|   | 中  |  |                                      |        |
| 薬剤名   | 投与量  | 手技   | 投与スケジュール                             |        |
| シクロホスファミド<br>エトポシド<br>シタラビン                       | 1200mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup><br>2000mg/m <sup>2</sup>   | 2時間で点滴<br>2時間で点滴<br>3時間で点滴                         | day1<br>day1-3<br>day2-3             |        |
| レジメン名   | CODOX-M (レジメンA②) day1,3髄注分   |  | 癌種                                   | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考  | 高悪性度非ホジキンリンパ腫/バーキットリンパ腫の治療に、IVAC療法 (レジメンB) と組み合わせて用いる。   | 1コース   | 内服・その他内容                             |        |
|   |  | 21日  |                                      |        |
|   | CODOX-M (レジメンA) は①と②にレジメンを分割。  | 催吐リスク  |                                      |        |
|   | 最小   |  |                                      |        |
| 薬剤名   | 投与量  | 手技   | 投与スケジュール                             |        |
| シタラビン<br>メトトレキサート                                 | 40mg/body<br>15mg/body   | 髄注<br>髄注   | day1,3<br>day15                      |        |
| レジメン名   | FND  |  | 癌種                                   | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考  | 悪性リンパ腫に対する標準的化学療法。   | 1コース   | 内服・その他内容                             |        |
|   |  | 28日  |                                      |        |
|   | 催吐リスク  |  |                                      |        |
|   | 軽  |  |                                      |        |
| 薬剤名   | 投与量  | 手技   | 投与スケジュール                             |        |
| フルダラビン<br>ミトキサントロン                                | 25mg/m <sup>2</sup><br>10mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴<br>30分で点滴                                   | day1-3<br>day1                       |        |
| レジメン名   | R-THP-COP-E (悪性リンパ腫)   |  | 癌種                                   | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考  | 高齢者における悪性リンパ腫に対する化学療法。   | 1コース   | 内服・その他内容                             |        |
|   |  | 21日  |                                      |        |
|   | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。   | 催吐リスク  |                                      |        |
|   | 中  |  |                                      |        |
| 薬剤名   | 投与量  | 手技   | 投与スケジュール                             |        |
| リツキシマブ<br>ピラルピシン<br>シクロホスファミド<br>ピンクリスチン<br>エトポシド | 375mg/m <sup>2</sup><br>30mg/m <sup>2</sup><br>500mg/m <sup>2</sup><br>1mg/m <sup>2</sup><br>80mg/m <sup>2</sup> | 2-3時間で点滴<br>30分で点滴<br>120分で点滴<br>10分で点滴<br>120分で点滴 | day1<br>day2<br>day2<br>day2<br>day2 |        |

| レジメン名         | 高齢者THP-COP (悪性リンパ腫)   |          | 癌種              | 悪性リンパ腫 |
|---------------|---|----------|-----------------|--------|
| 解説<br>備考      | 毒性を考慮した高齢者の悪性リンパ腫に対する汎用化学療法<br>法の1つ。  | 1コース     | 内服・その他内容        |        |
|               |   | 21日      |                 |        |
|               |   | 催吐リスク    |                 |        |
|               |   | 高        |                 |        |
| 薬剤名           | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール        |        |
| ピラルピシン        | 30mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴   | day1            |        |
| シクロホスファミド     | 500mg/m <sup>2</sup>  | 180分で点滴  | day1            |        |
| ビンクリスチン       | 1.0mg/m <sup>2</sup>  | 15分で点滴   | day1            |        |
| レジメン名         | THP-COP (悪性リンパ腫)  |          | 癌種              | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考      | 悪性リンパ腫に対する標準的化学療法。  | 1コース     | 内服・その他内容        |        |
|               |   | 21日      |                 |        |
|               |   | 催吐リスク    |                 |        |
|               |   | 高        |                 |        |
| 薬剤名           | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール        |        |
| ピラルピシン        | 50mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴   | day1            |        |
| シクロホスファミド     | 750mg/m <sup>2</sup>  | 120分で点滴  | day1            |        |
| ビンクリスチン       | 1.4mg/m <sup>2</sup>  | 10分で点滴   | day1            |        |
| レジメン名         | IVAC (レジメンB)  |          | 癌種              | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考      | 高悪性度非ホジキンリンパ腫/バーキットリンパ腫の治療<br>に、CODOX-M療法 (レジメンA) と組み合わせて用い                                 | 1コース     | 内服・その他内容        |        |
|               |   | 21日      |                 |        |
|               |   | 催吐リスク    |                 |        |
|               |   | 高        |                 |        |
| 薬剤名           | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール        |        |
| シタラビン①        | 2000mg/m <sup>2</sup>   | 2時間で点滴   | day1            |        |
| イホスファミド       | 1500mg/m <sup>2</sup>   | 2時間で点滴   | day1,3-5        |        |
| エトポシド         | 60mg/m <sup>2</sup>   | 2時間で点滴   | day1,3-5        |        |
| シタラビン②        | 2000mg/m <sup>2</sup>   | 2時間で点滴   | day1            |        |
| メトトレキサート      | 15mg/body   | 髄注       | day5            |        |
| レジメン名         | CODOX-M (レジメンA①)  |          | 癌種              | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考      | 高悪性度非ホジキンリンパ腫/バーキットリンパ腫の治療<br>に、IVAC療法 (レジメンB) と組み合わせて用いる。<br>CODOX-M (レジメンA) は①と②にレジメンを分割。 | 1コース     | 内服・その他内容        |        |
|               |   | 21日      |                 |        |
|               |   | 催吐リスク    |                 |        |
|               |   | 中        |                 |        |
| 薬剤名           | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール        |        |
| シクロホスファミド①, ② | 800, 200mg/m <sup>2</sup>   | 2時間で点滴   | day1, day2-5    |        |
| ビンクリスチン       | 1.5mg/m <sup>2</sup>  | 10分で点滴   | day1,8          |        |
| ドキソルビシン       | 40mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴   | day1            |        |
| メトトレキサート①, ②  | 536, 2461mg/m <sup>2</sup>  | 1, 23時間  | day10           |        |
| レジメン名         | R-CMD (CD20陽性悪性リンパ腫)  |          | 癌種              | 悪性リンパ腫 |
| 解説<br>備考      | 悪性リンパ腫に対する化学療法。<br>リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソ<br>プロストール・クロルフェニラミン)を行う。                     | 1コース     | 内服・その他内容        |        |
|               |   | 14日      |                 |        |
|               |   | 催吐リスク    |                 |        |
|               |   | 中        |                 |        |
| 薬剤名           | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール        |        |
| リツキシマブ        | 375mg/m <sup>2</sup>  | 2-3時間で点滴 | day1            |        |
| イリノテカン        | 25mg/m <sup>2</sup>   | 90分で点滴   | day 2 - 3 day 3 |        |
| ミトキサントロン      | 8mg/m <sup>2</sup>  | 30分で点滴   |                 |        |

|  |  |                                       |  |          |
|--|--|---------------------------------------|--|----------|
| レジメン名  | <b>ペムプロリズマブ (ホジキンリンパ腫)</b>   |                                       | 癌種                                       | ホジキンリンパ腫 |
| 解説<br>備考                                       | ホジキンリンパ腫の2次治療の標準治療のひとつ。  | 1コース                                  | 内服・その他内容                                 |          |
|  |  | 21日                                   |  |          |
|  |  | 催吐リスク                                 |  |          |
|  |  | 最小                                    |  |          |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                    | 投与スケジュール                                 |          |
| ペムプロリズマブ                                       | 200mg/body   | 30分で点滴                                | day1                                     |          |
| レジメン名  | <b>A+AVD</b>   |                                       | 癌種                                       | ホジキンリンパ腫 |
| 解説<br>備考                                       | ホジキンリンパ腫に対する標準的化学療法。   | 1コース                                  | 内服・その他内容                                 |          |
|  |  | 14日                                   |  |          |
|  | 最大6コース。  | 催吐リスク                                 |  |          |
|  |  | 高                                     |  |          |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                    | 投与スケジュール                                 |          |
| ドキシソルビシン<br>ビンブラスチン<br>ダカルバジン<br>プレントキシマブ ベドチン | 25mg/m <sup>2</sup><br>6mg/m <sup>2</sup><br>375mg/m <sup>2</sup><br>1.2mg/kg            | 30分で点滴<br>10分で点滴<br>120分で点滴<br>30分で点滴 | day1,15<br>day1,15<br>day1,15<br>day1,15 |          |
| レジメン名  | <b>6週毎 ペムプロリズマブ (ホジキンリンパ腫)</b>   |                                       | 癌種                                       | ホジキンリンパ腫 |
| 解説<br>備考                                       | ホジキンリンパ腫に対する二次治療のひとつ。  | 1コース                                  | 内服・その他内容                                 |          |
|  |  | 42日                                   |  |          |
|  |  | 催吐リスク                                 |  |          |
|  |  | 最小                                    |  |          |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                    | 投与スケジュール                                 |          |
| ペムプロリズマブ                                       | 400mg/body   | 30分で点滴                                | day1                                     |          |
| レジメン名  | <b>ABVD (ホジキンリンパ腫)</b>   |                                       | 癌種                                       | ホジキンリンパ腫 |
| 解説<br>備考                                       | ホジキンリンパ腫に対する標準的化学療法。   | 1コース                                  | 内服・その他内容                                 |          |
|  |  | 14日                                   |  |          |
|  |  | 催吐リスク                                 |  |          |
|  |  | 高                                     |  |          |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                    | 投与スケジュール                                 |          |
| ドキシソルビシン<br>ブレオマイシン<br>ビンブラスチン<br>ダカルバジン       | 25mg/m <sup>2</sup><br>10mg/m <sup>2</sup><br>6mg/m <sup>2</sup><br>250mg/m <sup>2</sup> | 30分で点滴<br>30分で点滴<br>10分で点滴<br>120分で点滴 | day1<br>day1<br>day1<br>day1             |          |
| レジメン名  | <b>4週毎 ニボルマブ (ホジキンリンパ腫)</b>  |                                       | 癌種                                       | ホジキンリンパ腫 |
| 解説<br>備考                                       | 再発難治性の古典的ホジキンリンパ腫の治療法のひとつ。   | 1コース                                  | 内服・その他内容                                 |          |
|  |  | 28日                                   |  |          |
|  |  | 催吐リスク                                 |  |          |
|  |  | 最小                                    |  |          |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                    | 投与スケジュール                                 |          |
| ニボルマブ  | 480mg/body   | 30分で点滴                                | day1                                     |          |

| レジメン名     |  | R-GEM (非ホジキンリンパ腫)         |  | 癌種                                 | 非ホジキンリンパ腫 |
|-----------|--|---------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫の救済療法の1つと分子標的治療薬の併用。                    | 1コース                      | 内服・その他内容   |                                    |           |
|           |  | 28日                       |  |                                    |           |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク                     |  |                                    |           |
|           |  | 軽                         |  |                                    |           |
| 薬剤名       |  | 投与量                       | 手技   | 投与スケジュール                           |           |
| ゲムシタビン    |  | 1000mg/m <sup>2</sup>     | 30分で点滴   | day1,8,15                          |           |
| リツキシマブ    |  | 375mg/m <sup>2</sup>      | 2-3時間で点滴   | 1サイクル目day1,8,15,22<br>2サイクル目以降day1 |           |
| レジメン名     |  | Biweekly CHOP             |  | 癌種                                 | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 難治性非ホジキンリンパ腫に対する化学療法の一つ。                         | 1コース                      | 内服・その他内容   |                                    |           |
|           |  | 14日                       |  |                                    |           |
| 備考        |  | 催吐リスク                     |  |                                    |           |
|           |  | 中                         |  |                                    |           |
| 薬剤名       |  | 投与量                       | 手技   | 投与スケジュール                           |           |
| ドキシソルビシン  |  | 50mg/m <sup>2</sup>       | 30分で点滴   | day1                               |           |
| シクロホスファミド |  | 750mg/m <sup>2</sup>      | 120分で点滴  | day1                               |           |
| ビンクリスチン   |  | 1.4mg/m <sup>2</sup>      | 10分で点滴   | day1                               |           |
| レジメン名     |  | MR-CHOP (CD20陽性非ホジキンリンパ腫) |  | 癌種                                 | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫に対する標準的化学療法と分子標的治療薬の併用。                 | 1コース                      | 内服・その他内容   |                                    |           |
|           |  | 21日                       |  |                                    |           |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク                     | プレドニゾロン 100mg/body 経口分3 (60-30-10)<br>day2-6<br>※65歳以上の場合、80%減量する。 |                                    |           |
|           |  | 中                         |  |                                    |           |
| 薬剤名       |  | 投与量                       | 手技   | 投与スケジュール                           |           |
| リツキシマブ    |  | 375mg/m <sup>2</sup>      | 2-3時間で点滴   | day1                               |           |
| メトトレキサート  |  | 2000mg/m <sup>2</sup> ※   | 3時間で点滴   | day2                               |           |
| ドキシソルビシン  |  | 50mg/m <sup>2</sup> ※     | 30分で点滴   | day4                               |           |
| シクロホスファミド |  | 750mg/m <sup>2</sup> ※    | 120分で点滴  | day4                               |           |
| ビンクリスチン   |  | 1.4mg/m <sup>2</sup> ※    | 10分で点滴   | day4                               |           |
| レジメン名     |  | リツキシマブ (ゼヴァリン前処置用)        |  | 癌種                                 | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 1日目および7-9日目のゼヴァリン使用前に投与。                         | 1コース                      | 内服・その他内容   |                                    |           |
|           |  |                           |  |                                    |           |
| 備考        |  | 催吐リスク                     |  |                                    |           |
|           |  | 最小                        |  |                                    |           |
| 薬剤名       |  | 投与量                       | 手技   | 投与スケジュール                           |           |
| リツキシマブ    |  | 250mg/m <sup>2</sup>      | 2-3時間で点滴   | day1,7(8,9)                        |           |
| レジメン名     |  | ESHAP                     |  | 癌種                                 | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫に対する標準的な救済療法の1つ。                        | 1コース                      | 内服・その他内容   |                                    |           |
|           |  | 28日                       |  |                                    |           |
| 備考        |  | 催吐リスク                     |  |                                    |           |
|           |  | 高                         |  |                                    |           |
| 薬剤名       |  | 投与量                       | 手技   | 投与スケジュール                           |           |
| エトポシド     |  | 40mg/m <sup>2</sup>       | 2時間で点滴   | day1-4                             |           |
| シスプラチン①   |  | 12.5mg/m <sup>2</sup>     | 12時間で点滴  | day1-4                             |           |
| シスプラチン②   |  | 12.5mg/m <sup>2</sup>     | 12時間で点滴  | day1-4                             |           |
| シタラビン     |  | 2000mg/m <sup>2</sup>     | 3時間で点滴   | day5                               |           |

|           |  |                       |                     |           |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|-----------|
| レジメン名     | <b>R-CHOP (CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫)</b>              |                       | 癌種                  | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫に対する標準的化学療法と分子標的治療薬の併用。                 | 1コース                  | 内服・その他内容            |           |
|           |  | 21日                   |                     |           |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク                 |                     |           |
|           |  | 高                     |                     |           |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール            |           |
| リツキシマブ    | 375mg/m <sup>2</sup>                             | 2-3時間で点滴              | day1                |           |
| ドキシソルビシン  | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                | day3                |           |
| シクロホスファミド | 750mg/m <sup>2</sup>                             | 120分で点滴               | day3                |           |
| ビンクリスチン   | 1.4mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴                | day3                |           |
| レジメン名     | <b>VNCOP-B (高齢者非ホジキンリンパ腫)</b>                    |                       | 癌種                  | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 高齢者非ホジキンリンパ腫の治療のひとつ。                             | 1コース                  | 内服・その他内容            |           |
|           |  | 56日                   |                     |           |
| 備考        |  | 催吐リスク                 | プレドニゾン 40mg/body 経口 |           |
|           |  | 中                     |                     |           |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール            |           |
| ミトキサントロン  | 10mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                | day1,15,29,43       |           |
| シクロホスファミド | 300mg/m <sup>2</sup>                             | 2時間で点滴                | day1,15,29,43       |           |
| ビンクリスチン   | 2mg/body   | 10分で点滴                | day8,22,36,50       |           |
| エトポシド     | 150mg/m <sup>2</sup>                             | 2時間で点滴                | day8,36             |           |
| プレオマイシン   | 10mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                | day22,50            |           |
| レジメン名     | <b>GCD</b>                                       |                       | 癌種                  | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫の救援療法の1つ。                               | 1コース                  | 内服・その他内容            |           |
|           |  | 21日                   |                     |           |
| 備考        |  | 催吐リスク                 |                     |           |
|           |  | 中                     |                     |           |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール            |           |
| ゲムシタビン    | 1000mg/m <sup>2</sup>                            | 30分で点滴                | day1,8              |           |
| カルボプラチン   | AUC=5  | 60分で点滴                | day1                |           |
| レジメン名     | <b>R-DHAP</b>                                    |                       | 癌種                  | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 非ホジキンリンパ腫の標準的な救援療法の1つ。                           | 1コース                  | 内服・その他内容            |           |
|           |  | 28日                   |                     |           |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク                 |                     |           |
|           |  | 高                     |                     |           |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール            |           |
| リツキシマブ    | 375mg/m <sup>2</sup>                             | 2-3時間で点滴              | day1                |           |
| シスプラチン    | 100mg/m <sup>2</sup>                             | 24時間で点滴               | day2                |           |
| シタラビン①    | 2000mg/m <sup>2</sup>                            | 3時間で点滴                | day3                |           |
| シタラビン②    | 2000mg/m <sup>2</sup>                            | 3時間で点滴<br>②は①と12時間空ける | day3                |           |
| レジメン名     | <b>R-miniCHOP (CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫)</b>          |                       | 癌種                  | 非ホジキンリンパ腫 |
| 解説        | 高齢者の非ホジキンリンパ腫に対する標準的化学療法と分子標的治療薬の併用。             | 1コース                  | 内服・その他内容            |           |
|           |  | 21日                   |                     |           |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク                 |                     |           |
|           |  | 中                     |                     |           |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール            |           |
| リツキシマブ    | 375mg/m <sup>2</sup>                             | 2-3時間で点滴              | day1                |           |
| ドキシソルビシン  | 25mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                | day3                |           |
| シクロホスファミド | 400mg/m <sup>2</sup>                             | 120分で点滴               | day3                |           |
| ビンクリスチン   | 1mg/m <sup>2</sup>                               | 10分で点滴                | day3                |           |



|               |  |                       |   |            |
|---------------|--|-----------------------|---|------------|
| レジメン名         | DHAP   |                       | 癌種                                      | 非ホジキンリンパ腫  |
| 解説            | 非ホジキンリンパ腫の標準的な救援療法の1つ。                           | 1コース                  | 内服・その他内容                                |            |
|               |  | 28日                   |   |            |
| 備考            |  | 催吐リスク                 |   |            |
|               |  | 高                     |   |            |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール                                |            |
| シスプラチン        | 100mg/m <sup>2</sup>                             | 24時間で点滴               | day1                                    |            |
| シタラビン①        | 2000mg/m <sup>2</sup>                            | 3時間で点滴                | day2                                    |            |
| シタラビン②        | 2000mg/m <sup>2</sup>                            | 3時間で点滴<br>②は①と12時間空ける | day2                                    |            |
| レジメン名         | VR-CAP   |                       | 癌種                                      | マンツル細胞リンパ腫 |
| 解説            | マンツル細胞リンパ腫に対する治療                                 | 1コース                  | 内服・その他内容                                |            |
|               |  | 21日                   |   |            |
| 備考            | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミノプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク                 | プレドニゾン 100mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day2-6 |            |
|               |  | 中                     |   |            |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール                                |            |
| リツキシマブ        | 375mg/m <sup>2</sup>                             | 2-3時間で点滴              | day1                                    |            |
| ドキシソルビシン      | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                | day2                                    |            |
| シクロホスファミド     | 750mg/m <sup>2</sup>                             | 2時間で点滴                | day2                                    |            |
| ボルテソミブ        | 1.3mg/m <sup>2</sup>                             | 皮下注                   | dday2,5,9,12                            |            |
| レジメン名         | A+CHP  |                       | 癌種                                      | 末梢性T細胞リンパ腫 |
| 解説            | 未治療のCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)に対する治療法の一つ。           | 1コース                  | 内服・その他内容                                |            |
|               |  | 21日                   |   |            |
| 備考            | 最大8コース   | 催吐リスク                 | プレドニゾン：100mg/body 経口分3 day1-5           |            |
|               |  | 中                     |   |            |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール                                |            |
| ドキシソルビシン      | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                | day1                                    |            |
| シクロホスファミド     | 750mg/m <sup>2</sup>                             | 120分で点滴               | day1                                    |            |
| ブレンツキシマブ ベドチン | 1.8mg/kg   | 30分で点滴                | day1                                    |            |
| レジメン名         | プララトレキサート  |                       | 癌種                                      | 末梢性T細胞リンパ腫 |
| 解説            | 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫                               | 1コース                  | 内服・その他内容                                |            |
|               |  | 49日                   |   |            |
| 備考            | 葉酸およびビタミンB12の投与を行う。                              | 催吐リスク                 |   |            |
|               |  | 最小                    |   |            |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール                                |            |
| プララトレキサート     | 30mg/m <sup>2</sup>                              | 5分で点滴                 | day1,8,15,22,29,36                      |            |
| レジメン名         | ロミデプシン   |                       | 癌種                                      | 末梢性T細胞リンパ腫 |
| 解説            | 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫                               | 1コース                  | 内服・その他内容                                |            |
|               |  | 28日                   |   |            |
| 備考            |  | 催吐リスク                 |   |            |
|               |  | 軽                     |   |            |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール                                |            |
| ロミデプシン        | 14mg/m <sup>2</sup>                              | 4時間で点滴                | day1,8,15                               |            |

|           |  |            |  |               |
|-----------|--|------------|--|---------------|
| レジメン名     | <b>R-MPV (中枢神経系原発悪性リンパ腫)</b>                     |            | 癌種   | 中枢神経系原発悪性リンパ腫 |
| 解説        | 中枢神経系原発悪性リンパ腫の治療法のひとつ。                           | 1コース       | 内服・その他内容<br>塩酸プロカルバジン 100mg/m <sup>2</sup> 経口 奇数コースのday2-8 |               |
|           |  | 14日        |  |               |
| 備考        | リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク      |  |               |
|           |  | 高          |  |               |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技         | 投与スケジュール   |               |
| リツキシマブ    | 375mg/m <sup>2</sup>                             | 2-3時間で点滴   | day1   |               |
| ビンクリスチン   | 1.4mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴     | day2   |               |
| メトトレキサート  | 3500mg/m <sup>2</sup>                            | 3時間で点滴     | day2   |               |
| レジメン名     | <b>MTX+MCNU+PCZ</b>                              |            | 癌種   | 中枢神経系原発悪性リンパ腫 |
| 解説        | 悪性リンパ腫に対する治療法の1つ。                                | 1コース       | 内服・その他内容<br>塩酸プロカルバジン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分1 day1-7      |               |
|           |  | 42日        |  |               |
| 備考        |  | 催吐リスク      |  |               |
|           |  | 中          |  |               |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技         | 投与スケジュール   |               |
| ラニムスチン    | 40mg/m <sup>2</sup>                              | 60分で点滴     | C1day1,10,20,C2-day1                                       |               |
| メトトレキサート  | 1000mg/m <sup>2</sup>                            | 6時間で点滴     | C1day1,10,20,C2-day1                                       |               |
| メトトレキサート  | 15mg/body  | 髄注         | C1day1,5,10,15,C2-day1                                     |               |
| シタラビン     | 40mg/body  | 髄注         | C1day1,5,10,15,C2-day1<br>(C=コース)                          |               |
| レジメン名     | <b>クラドリピン</b>                                    |            | 癌種   | ヘアリーセル白血病     |
| 解説        | ヘアリーセル白血病に対する治療法。                                | 1コース       | 内服・その他内容   |               |
|           |  | 7日         |  |               |
| 備考        |  | 催吐リスク      |  |               |
|           |  | 最小         |  |               |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技         | 投与スケジュール   |               |
| クラドリピン    | 0.09mg/kg  | 24時間持続点滴   | day1-7   |               |
| レジメン名     | <b>オビヌツズマブ-CHOP</b>                              |            | 癌種   | 濾胞性リンパ腫       |
| 解説        | 濾胞性リンパ腫に対する標準的化学療法と分子標的治療薬の併用。                   | 1コース       | 内服・その他内容<br>プレドニゾロン 100mg/body 経口分3 (60-30-10)<br>day2-6   |               |
|           |  | 21日        |  |               |
| 備考        | 最大8コースまで。前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。  | 催吐リスク      |  |               |
|           |  | 中          |  |               |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技         | 投与スケジュール   |               |
| オビヌツズマブ   | 1000mg/body                                      | 4-6時間程度で点滴 | 1コース目day1,8,15   |               |
| オビヌツズマブ   | 1000mg/body                                      | 3-5時間程度で点滴 | 2コース目以降day1  |               |
| ドキシソルビシン  | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴     | day2   |               |
| シクロホスファミド | 750mg/m <sup>2</sup>                             | 120分で点滴    | day2   |               |
| ビンクリスチン   | 1.4mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴     | day2   |               |
| レジメン名     | <b>オビヌツズマブ-トレアキシ</b>                             |            | 癌種   | 濾胞性リンパ腫       |
| 解説        | 再発難治性濾胞性リンパ腫に対する新規化学療法と分子標的治療薬の併用。               | 1コース       | 内服・その他内容   |               |
|           |  | 28日        |  |               |
| 備考        | 最大6コースまで。前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。  | 催吐リスク      |  |               |
|           |  | 中          |  |               |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技         | 投与スケジュール   |               |
| オビヌツズマブ   | 1000mg/body                                      | 4-6時間程度で点滴 | 1コース目day1,8,15   |               |
| オビヌツズマブ   | 1000mg/body                                      | 3-5時間程度で点滴 | 2コース目以降day1  |               |
| ベンダムスチン   | 90mg/m <sup>2</sup>                              | 60分で点滴     | day2,3   |               |

|             |  |                            |             |          |                 |
|-------------|--|----------------------------|-------------|----------|-----------------|
| レジメン名       |  | <b>オビヌツズマブ 単剤維持</b>        |             | 癌種       | 濾胞性リンパ腫         |
| 解説<br>備考    | CD20陽性濾胞性リンパ腫に対する維持療法。                 |                            | 1コース        | 内服・その他内容 |                 |
|             |  |                            | 56日         |          |                 |
|             | 前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 |                            | 催吐リスク<br>最小 |          |                 |
| 薬剤名         |  | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール |                 |
| オビヌツズマブ     |  | 1000mg/body                | 3-5時間程度で点滴  | day1     |                 |
| レジメン名       |  | <b>ポラツズマブ ベドチン+RB</b>      |             | 癌種       | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 解説<br>備考    | 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する治療法。        |                            | 1コース        | 内服・その他内容 |                 |
|             |  |                            | 21日         |          |                 |
|             |  |                            | 催吐リスク<br>中  |          |                 |
| 薬剤名         |  | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール |                 |
| リツキシマブ      |  | 375mg/m <sup>2</sup>       | 2-3時間で点滴    | day1     |                 |
| ポラツズマブ ベドチン |  | 1.8mg/kg                   | 30-90分で点滴   | day2     |                 |
| ベンダムスチン     |  | 90mg/m <sup>2</sup>        | 60分で点滴      | day2-3   |                 |
| レジメン名       |  | <b>RB (DLBCL)</b>          |             | 癌種       | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 解説<br>備考    | 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する治療法。        |                            | 1コース        | 内服・その他内容 |                 |
|             |  |                            | 21日         |          |                 |
|             |  |                            | 催吐リスク<br>中  |          |                 |
| 薬剤名         |  | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール |                 |
| リツキシマブ      |  | 375mg/m <sup>2</sup>       | 2-3時間で点滴    | day1     |                 |
| ベンダムスチン     |  | 120mg/m <sup>2</sup>       | 1時間で点滴      | day2-3   |                 |
| レジメン名       |  | <b>脳脊髄腔(腰椎)注射(AML,ALL)</b> |             | 癌種       | 白血病             |
| 解説<br>備考    | 急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、悪性リンパ腫の標準的治療の1つ。    |                            | 1コース        | 内服・その他内容 |                 |
|             |  |                            | 1           |          |                 |
|             |  |                            | 催吐リスク<br>最小 |          |                 |
| 薬剤名         |  | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール |                 |
| シタラビン       |  | 40mg/body                  | 脳脊髄腔注       | day1     |                 |
| メトトレキサート    |  | 15mg/body                  | 脳脊髄腔注       | day1     |                 |
| レジメン名       |  | <b>mini MEC</b>            |             | 癌種       | 急性白血病           |
| 解説<br>備考    | 再発・難治性急性白血病に対する汎用救済化学療法の一つ。            |                            | 1コース        | 内服・その他内容 |                 |
|             |  |                            | 28日         |          |                 |
|             |  |                            | 催吐リスク<br>軽  |          |                 |
| 薬剤名         |  | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール |                 |
| ミトキサントロン    |  | 8mg/m <sup>2</sup>         | 30分で点滴      | day1-3   |                 |
| エトポシド       |  | 100mg/m <sup>2</sup>       | 3時間で点滴      | day1-5   |                 |
| シタラビン       |  | 100mg/m <sup>2</sup>       | 24時間持続点滴    | day1-7   |                 |

|  |  |  |                                      |   |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| レジメン名  | MTX・ロイコボリン救援療法（6hr）（白血病）   |  | 癌種                                   | 急性白血病   |
| 解説<br>備考   | 急性白血病、悪性リンパ腫に対する治療法。   |  | 1コース                                 | 内服・その他内容  |
|  |  |  | 21日                                  |   |
|  |  |  | 催吐リスク                                |   |
|  |  |  | 中                                    |   |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                     | 投与スケジュール                             |   |
| メトトレキサート   | 3500mg/m <sup>2</sup>  | 6時間で点滴                                 | day1                                 |   |
| レジメン名  | 【臨】 JALSG GML200 高齢者AML 地固め3コース目   |  | 癌種                                   | 急性骨髄性白血病  |
| 解説<br>備考   | 高齢者急性骨髄性白血病に対する治療法   |  | 1コース                                 | 内服・その他内容  |
|  |  |  | 28日                                  |   |
|  |  |  | 催吐リスク                                |   |
|  |  |  | 中                                    | 年齢が70歳以上80歳未満の場合、アクリルピシンを10mg/m <sup>2</sup> へ減量する。   |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                     | 投与スケジュール                             |   |
| エノシタビン<br>アクリルピシン                                      | 200mg/m <sup>2</sup><br>14mg/m <sup>2</sup>  | 3時間で点滴<br>30分で点滴                       | day1-5<br>day1-5                     |   |
| レジメン名  | 【臨】 JALSG GML219 DNR+Ara-C 寛解導入  |  | 癌種                                   | 急性骨髄性白血病  |
| 解説<br>備考   | 急性骨髄性白血病（AML）の寛解導入療法   |  | 1コース                                 | 内服・その他内容  |
|  |  |  | 28日                                  |   |
|  | 65歳以上74歳以下   |  | 催吐リスク                                |   |
|  |  |  | 中                                    |   |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                     | 投与スケジュール                             |   |
| ダウノルビシン(65-69歳)<br>ダウノルビシン(70-74歳)<br>シタラビン①<br>シタラビン② | 45mg/m <sup>2</sup><br>35mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup><br>50mg/m <sup>2</sup> | 30分で点滴<br>30分で点滴<br>12時間で点滴<br>12時間で点滴 | day1-3<br>day1-3<br>day1-7<br>day1-7 |   |
| レジメン名  | アザシチジン点滴静注+ベネトクラクス（急性骨髄性白血病）   |  | 癌種                                   | 急性骨髄性白血病  |
| 解説<br>備考   | 急性骨髄性白血病の治療として適応があるため。   |  | 1コース                                 | 内服・その他内容  |
|  |  |  | 28日                                  |   |
|  |  |  | 催吐リスク                                |   |
|  |  |  | 中                                    | ベネトクラクス 漸増期：100mg/b【day1】，200mg/b【day2】，300mg/b【day3】，400mg/b【day4】 維持期 400mg/b【day5-】 経口分1（b=body） |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                     | 投与スケジュール                             |   |
| アザシチジン   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 10分で点滴                                 | day1-7                               |   |
| レジメン名  | アザシチジン皮下注+ベネトクラクス（急性骨髄性白血病）  |  | 癌種                                   | 急性骨髄性白血病  |
| 解説<br>備考   | 急性骨髄性白血病の治療として適応があるため。   |  | 1コース                                 | 内服・その他内容  |
|  |  |  | 28日                                  |   |
|  |  |  | 催吐リスク                                |   |
|  |  |  | 中                                    | ベネトクラクス 漸増期：100mg/b【day1】，200mg/b【day2】，300mg/b【day3】，400mg/b【day4】 維持期 400mg/b【day5-】 経口分1（b=body） |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技                                     | 投与スケジュール                             |   |
| アザシチジン   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 皮下注                                    | day1-7                               |   |

| レジメン名   | 【臨】 JALSG AML201 D群 地固め2コース目      |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
|---------|-----------------------------------|---------|----------|----------|
| 解説      | 急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法。               | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|         |                                   | 28日     |          |          |
| 備考      | 高齢者へ使用する場合、投与量は30%減とし、投与日を1日短縮する。 | 催吐リスク   |          |          |
|         |                                   | 中       |          |          |
| 薬剤名     | 投与量                               | 手技      | 投与スケジュール |          |
| ダウノルビシン | 50mg/m <sup>2</sup>               | 30分で点滴  | day1-3   |          |
| シタラビン   | 100mg/m <sup>2</sup>              | 12時間で点滴 | day1-5   |          |
| シタラビン   | 100mg/m <sup>2</sup>              | 12時間で点滴 | day1-5   |          |

| レジメン名    | 【臨】 JALSG AML201 D群 地固め1コース目      |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
|----------|-----------------------------------|---------|----------|----------|
| 解説       | 急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法。               | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|          |                                   | 28日     |          |          |
| 備考       | 高齢者へ使用する場合、投与量は30%減とし、投与日を1日短縮する。 | 催吐リスク   |          |          |
|          |                                   | 軽       |          |          |
| 薬剤名      | 投与量                               | 手技      | 投与スケジュール |          |
| ミトキサントロン | 7mg/m <sup>2</sup>                | 30分で点滴  | day1-3   |          |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>              | 12時間で点滴 | day1-5   |          |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>              | 12時間で点滴 | day1-5   |          |

| レジメン名         | 【臨】 JALSG APL212 地固め 4コース      |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
|---------------|--------------------------------|---------|----------|----------|
| 解説            | 再発・難治性のCD33陽性の急性骨髄性白血病に対する治療法。 | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|               |                                | 14日     |          |          |
| 備考            |                                | 催吐リスク   |          |          |
|               |                                | 最小      |          |          |
| 薬剤名           | 投与量                            | 手技      | 投与スケジュール |          |
| ゲムツズマブオゾガマイシン | 4mg/m <sup>2</sup>             | 120分で点滴 | day1     |          |

| レジメン名   | 【臨】 JALSG GML200 高齢者AML B群 寛解導入 |        | 癌種                             | 急性骨髄性白血病 |
|---------|---------------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| 解説      | 高齢者急性骨髄性白血病に対する治療法              | 1コース   | 内服・その他内容                       |          |
|         |                                 | 28日    |                                |          |
| 備考      |                                 | 催吐リスク  | ※day8,10に骨髄穿刺を行い、結果により治療を追加する。 |          |
|         |                                 | 中      |                                |          |
| 薬剤名     | 投与量                             | 手技     | 投与スケジュール                       |          |
| エノシタピン  | 200mg/m <sup>2</sup>            | 3時間で点滴 | day1-8(※9-10,11-12)            |          |
| ダウノルビシン | 40mg/m <sup>2</sup>             | 30分で点滴 | day1-3(※8-9,11-12)             |          |

| レジメン名    | 【臨】 JALSG GML219 地固め C3 髄注   |       | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
|----------|------------------------------|-------|----------|----------|
| 解説       | 急性骨髄性白血病（AML）の地固め3コース終了後に行う。 | 1コース  | 内服・その他内容 |          |
|          |                              |       |          |          |
| 備考       |                              | 催吐リスク |          |          |
|          |                              | 最小    |          |          |
| 薬剤名      | 投与量                          | 手技    | 投与スケジュール |          |
| メトトレキサート | 15mg/body                    | 髄注    |          |          |
| シタラビン    | 40mg/body                    | 髄注    |          |          |
| プレドニゾン   | 10mg/body                    | 髄注    |          |          |

|                 |                                   |             |  |          |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|----------|
| レジメン名           | 【臨】 JALSG GML219 DNR+Ara-C 地固め C2 |             | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説<br>備考        | 急性骨髄性白血病（AML）の地固め2コース目            | 1コース        | 内服・その他内容   |          |
|                 |                                   | 21日         |  |          |
|                 |                                   | 催吐リスク<br>中  |  |          |
| 薬剤名             | 投与量                               | 手技          | 投与スケジュール   |          |
| ダウノルビシン(65-69歳) | 40mg/m <sup>2</sup>               | 30分で点滴      | day1-2   |          |
| ダウノルビシン(70-74歳) | 30mg/m <sup>2</sup>               | 30分で点滴      | day1-2   |          |
| シタラビン①          | 50mg/m <sup>2</sup>               | 12時間で点滴     | day1-5   |          |
| シタラビン②          | 50mg/m <sup>2</sup>               | 12時間で点滴     | day1-5   |          |
| レジメン名           | Ara-C+ベネトクラクス                     |             | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説<br>備考        | 急性骨髄性白血病の治療として適応があるため。            | 1コース        | 内服・その他内容<br>ベネトクラクス 漸増期：100mg/b【day1】，200mg/b【day2】，400mg/b【day3】，600mg/b【day4】 維持期 600mg/b【day5-】 経口分1 (b=body) |          |
|                 |                                   | 28日         |  |          |
|                 |                                   | 催吐リスク<br>最小 |  |          |
| 薬剤名             | 投与量                               | 手技          | 投与スケジュール   |          |
| シタラビン           | 20mg/m <sup>2</sup>               | 皮下注         | day1-10  |          |
| レジメン名           | 【臨】 JALSG AML201 A群 寛解導入          |             | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説<br>備考        | 急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法。               | 1コース        | 内服・その他内容   |          |
|                 |                                   | 28日         |  |          |
|                 |                                   | 催吐リスク<br>軽  |  |          |
| 薬剤名             | 投与量                               | 手技          | 投与スケジュール   |          |
| イダルビシン          | 12mg/m <sup>2</sup>               | 30分で点滴      | day1-3   |          |
| シタラビン           | 50mg/m <sup>2</sup>               | 12時間で点滴     | day1-7   |          |
| シタラビン           | 50mg/m <sup>2</sup>               | 12時間で点滴     | day1-7   |          |
| レジメン名           | GO                                |             | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説<br>備考        | 再発・難治性のCD33陽性の急性骨髄性白血病に対する治療法。    | 1コース        | 内服・その他内容   |          |
|                 | 投与は2コースまで。                        | 14日         |  |          |
|                 |                                   | 催吐リスク<br>最小 |  |          |
| 薬剤名             | 投与量                               | 手技          | 投与スケジュール   |          |
| ゲムツズマブオゾガマイシン   | 9mg/m <sup>2</sup>                | 2時間で点滴      | day1   |          |
| レジメン名           | 【臨】 JALSG GML200 高齢者AML 地固め2コース目  |             | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説<br>備考        | 高齢者急性骨髄性白血病に対する治療法                | 1コース        | 内服・その他内容<br>※年齢が70歳以上80歳未満の場合、ダウノルビシンを25mg/m <sup>2</sup> に、エトポシドを75mg/m <sup>2</sup> に減量する。                     |          |
|                 |                                   | 28日         |  |          |
|                 |                                   | 催吐リスク<br>中  |  |          |
| 薬剤名             | 投与量                               | 手技          | 投与スケジュール   |          |
| エトポシド           | 100mg/m <sup>2</sup> ※            | 90分で点滴      | day1-3   |          |
| エノシタピン          | 200mg/m <sup>2</sup>              | 3時間で点滴      | day1-5   |          |
| ダウノルビシン         | 30mg/m <sup>2</sup> ※             | 30分で点滴      | day1,2   |          |

|                  |                                   |                        |  |          |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|--|----------|
| レジメン名            | 【臨】 JALSG GML219 ACR+Ara-C 地固め C3 |                        | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説               | 急性骨髄性白血病（AML）の地固め3コース目            | 1コース                   | 内服・その他内容                                     |          |
|                  |                                   | 21日                    |  |          |
| 備考               | 3C終了後、血小板数10万/ $\mu$ Lに回復次第随注。    | 催吐リスク                  |  |          |
|                  |                                   | 軽                      |  |          |
| 薬剤名              | 投与量                               | 手技                     | 投与スケジュール                                     |          |
| アクリルビシン(65-69歳)  | 16mg/ $m^2$                       | 30分で点滴                 | day1-5                                       |          |
| アクリルビシン(70-74歳)  | 14mg/ $m^2$                       | 30分で点滴                 | day1-5                                       |          |
| シタラビン①           | 50mg/ $m^2$                       | 12時間で点滴                | day1-5                                       |          |
| シタラビン②           | 50mg/ $m^2$                       | 12時間で点滴                | day1-5                                       |          |
| レジメン名            | 【臨】 JALSG GML219 MIT+Ara-C 地固め C1 |                        | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説               | 急性骨髄性白血病（AML）の地固め1コース目            | 1コース                   | 内服・その他内容                                     |          |
|                  |                                   | 21日                    |  |          |
| 備考               | 65歳以上74歳以下                        | 催吐リスク                  |  |          |
|                  |                                   | 軽                      |  |          |
| 薬剤名              | 投与量                               | 手技                     | 投与スケジュール                                     |          |
| ミトキサントロン(65-69歳) | 7mg/ $m^2$                        | 30分で点滴                 | day1-3                                       |          |
| ミトキサントロン(70-74歳) | 5mg/ $m^2$                        | 30分で点滴                 | day1-3                                       |          |
| シタラビン①           | 100mg/ $m^2$                      | 12時間で点滴                | day1-5                                       |          |
| シタラビン②           | 100mg/ $m^2$                      | 12時間で点滴                | day1-5                                       |          |
| レジメン名            | 【臨】 JALSG GML200 高齢者AML 地固め1コース目  |                        | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説               | 高齢者急性骨髄性白血病に対する治療法                | 1コース                   | 内服・その他内容                                     |          |
|                  |                                   | 28日                    |  |          |
| 備考               |                                   | 催吐リスク                  | ※年齢が70歳以上80歳未満の場合、ミトキサントロンを5mg/ $m^2$ に減量する。 |          |
|                  |                                   | 中                      |  |          |
| 薬剤名              | 投与量                               | 手技                     | 投与スケジュール                                     |          |
| エノシタピン           | 200mg/ $m^2$                      | 3時間で点滴                 | day1-5                                       |          |
| ミトキサントロン         | 7mg/ $m^2$ ※                      | 30分で点滴                 | day1-3                                       |          |
| レジメン名            | 【臨】 JALSG AML 再寛解導入 s-HAM         |                        | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説               | 毒性を考慮した急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法の1つ。     | 1コース                   | 内服・その他内容                                     |          |
|                  |                                   | 28日                    |  |          |
| 備考               |                                   | 催吐リスク                  |  |          |
|                  |                                   | 中                      |  |          |
| 薬剤名              | 投与量                               | 手技                     | 投与スケジュール                                     |          |
| シタラビン①           | 2000mg/ $m^2$                     | 3時間で点滴                 | day1,2,8,9                                   |          |
| ミトキサントロン         | 10mg/ $m^2$                       | 30分で点滴                 | day3,4,10,11                                 |          |
| シタラビン②           | 2000mg/ $m^2$                     | 3時間で点滴<br>①と②は12時間空ける  | day1,2,8,9                                   |          |
| レジメン名            | 【臨】 JALSG AML201 C群 地固め           |                        | 癌種   | 急性骨髄性白血病 |
| 解説               | 急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法。               | 1コース                   | 内服・その他内容                                     |          |
|                  |                                   | 28日                    |  |          |
| 備考               |                                   | 催吐リスク                  |  |          |
|                  |                                   | 中                      |  |          |
| 薬剤名              | 投与量                               | 手技                     | 投与スケジュール                                     |          |
| シタラビン            | 2000mg/ $m^2$                     | 3時間で点滴                 | day1-5                                       |          |
| シタラビン            | 2000mg/ $m^2$                     | 3時間で点滴<br>(間隔は12時間空ける) | day1-5                                       |          |



|          |                                       |         |          |          |
|----------|---------------------------------------|---------|----------|----------|
| レジメン名    | <b>MEC (急性骨髄性白血病)</b>                 |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
| 解説       | 再発・難治性急性骨髄性白血病に対する汎用救済化学療法<br>の1つ。    | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|          |                                       | 28日     |          |          |
| 備考       |                                       | 催吐リスク   |          |          |
|          |                                       | 中       |          |          |
| 薬剤名      | 投与量                                   | 手技      | 投与スケジュール |          |
| エトポシド    | 80mg/m <sup>2</sup>                   | 2時間で点滴  | day1-6   |          |
| シタラビン    | 1000mg/m <sup>2</sup>                 | 6時間で点滴  | day1-6   |          |
| ミトキサントロン | 6mg/m <sup>2</sup>                    | 30分で点滴  | day1-6   |          |
| レジメン名    | <b>【臨】 JALSG AML201 B群 寛解導入</b>       |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
| 解説       | 急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法。                   | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|          |                                       | 28日     |          |          |
| 備考       |                                       | 催吐リスク   |          |          |
|          |                                       | 軽       |          |          |
| 薬剤名      | 投与量                                   | 手技      | 投与スケジュール |          |
| ダウノルビシン  | 50mg/m <sup>2</sup>                   | 30分で点滴  | day1-3   |          |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup>                   | 12時間で点滴 | day1-7   |          |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup>                   | 12時間で点滴 | day1-7   |          |
| レジメン名    | <b>【臨】 JALSG AML201 D群 地固め4コース目</b>   |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
| 解説       | 急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法。                   | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|          |                                       | 28日     |          |          |
| 備考       | 高齢者へ使用する場合、投与量は30%減とし、投与日を1<br>日短縮する。 | 催吐リスク   |          |          |
|          |                                       | 軽       |          |          |
| 薬剤名      | 投与量                                   | 手技      | 投与スケジュール |          |
| エトポシド    | 100mg/m <sup>2</sup>                  | 90分で点滴  | day1-5   |          |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴 | day1-5   |          |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴 | day1-5   |          |
| ピンクリスチン  | 100mg/m <sup>2</sup>                  | 全開      | day8     |          |
| ビンデシン    | 0.8mg/m <sup>2</sup>                  | 全開      | day10    |          |
| レジメン名    | <b>【臨】 JALSG AML201 D群 地固め3コース目</b>   |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
| 解説       | 急性骨髄性白血病に対する汎用化学療法。                   | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|          |                                       | 28日     |          |          |
| 備考       | 高齢者へ使用する場合、投与量は30%減とし、投与日を1<br>日短縮する。 | 催吐リスク   |          |          |
|          |                                       | 軽       |          |          |
| 薬剤名      | 投与量                                   | 手技      | 投与スケジュール |          |
| アクリラルビシン | 20mg/m <sup>2</sup>                   | 30分で点滴  | day1-5   |          |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴 | day1-5   |          |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴 | day1-5   |          |
| レジメン名    | <b>low dose Ara-C+VP-16</b>           |         | 癌種       | 急性骨髄性白血病 |
| 解説       | 再発・難治性急性骨髄性白血病に対する救済化学療法の1<br>つ。      | 1コース    | 内服・その他内容 |          |
|          |                                       | 28日     |          |          |
| 備考       |                                       | 催吐リスク   |          |          |
|          |                                       | 軽       |          |          |
| 薬剤名      | 投与量                                   | 手技      | 投与スケジュール |          |
| エトポシド    | 50mg/body                             | 24時間で点滴 | day1-14  |          |
| シタラビン    | 20mg/body                             | 24時間で点滴 | day1-14  |          |



|          |                                |                      |  |            |
|----------|--------------------------------|----------------------|--|------------|
| レジメン名    | 【臨】 JALSG APL212 寛解導入 D群 (B→D) |                      | 癌種   | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説       | 急性前骨髄球性白血病に対する汎用化学療法。          | 1コース                 | 内服・その他内容   |            |
|          |                                | 2日                   |  |            |
| 備考       | B群施行時                          | 催吐リスク                | 治療前の末梢血白血球数およびAPL細胞数によりA,B,C群により治療を開始し、途中APL細胞数が増加した場合にD群として追加療法を行う。 |            |
|          |                                | 中                    |  |            |
| 薬剤名      |                                | 投与量                  | 手技   | 投与スケジュール   |
| イダルビシン   |                                | 12mg/m <sup>2</sup>  | 30分で点滴   | day1       |
| シタラビン    |                                | 50mg/m <sup>2</sup>  | 12時間で点滴  | day1-2     |
| シタラビン    |                                | 50mg/m <sup>2</sup>  | 12時間で点滴  | day1-2     |
| レジメン名    | 【臨】 JALSG APL205R 地固め          |                      | 癌種   | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説       | 再発・難治性の急性前骨髄球性白血病に対する化学療法。     | 1コース                 | 内服・その他内容   |            |
|          |                                | 25日                  |  |            |
| 備考       |                                | 催吐リスク                |  |            |
|          |                                | 中                    |  |            |
| 薬剤名      |                                | 投与量                  | 手技   | 投与スケジュール   |
| 三酸化二ヒ素   |                                | 0.15mg/kg            | 120分で点滴  | day1-25    |
| レジメン名    | 【臨】 JALSG APL212 寛解導入 B群       |                      | 癌種   | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説       | 急性前骨髄球性白血病に対する汎用化学療法。          | 1コース                 | 内服・その他内容   |            |
|          |                                | 5日                   |  |            |
| 備考       |                                | 催吐リスク                |  |            |
|          |                                | 中                    |  |            |
| 薬剤名      |                                | 投与量                  | 手技   | 投与スケジュール   |
| イダルビシン   |                                | 12mg/m <sup>2</sup>  | 30分で点滴   | day1-2     |
| シタラビン    |                                | 50mg/m <sup>2</sup>  | 12時間で点滴  | day1-5     |
| シタラビン    |                                | 50mg/m <sup>2</sup>  | 12時間で点滴  | day1-5     |
| レジメン名    | 【臨】 JALSG APL212 地固め 2コース      |                      | 癌種   | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説       | 急性前骨髄球性白血病 (APL) の治療法          | 1コース                 | 内服・その他内容   |            |
|          |                                | 21日                  |  |            |
| 備考       |                                | 催吐リスク                |  |            |
|          |                                | 中                    |  |            |
| 薬剤名      |                                | 投与量                  | 手技   | 投与スケジュール   |
| ダウノルビシン  |                                | 50mg/m <sup>2</sup>  | 30分で点滴   | day1-3     |
| シタラビン    |                                | 100mg/m <sup>2</sup> | 12時間で点滴  | day1-5     |
| シタラビン    |                                | 100mg/m <sup>2</sup> | 12時間で点滴  | day1-5     |
| レジメン名    | 【臨】 JALSG APL204 地固めC1         |                      | 癌種   | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説       | 急性前骨髄球性白血病 (APL) の治療法          | 1コース                 | 内服・その他内容   |            |
|          |                                | 28日                  |  |            |
| 備考       |                                | 催吐リスク                |  |            |
|          |                                | 軽                    |  |            |
| 薬剤名      |                                | 投与量                  | 手技   | 投与スケジュール   |
| ミトキサントロン |                                | 12mg/m <sup>2</sup>  | 30分で点滴   | day1-3     |
| シタラビン①   |                                | 100mg/m <sup>2</sup> | 12時間で点滴  | day1-5     |
| シタラビン②   |                                | 100mg/m <sup>2</sup> | 12時間で点滴<br>①と②は12時間空ける   | day1-5     |

|         |                                      |                        |                                  |            |
|---------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| レジメン名   | 【臨】 JALSG APL204 C群 寛解導入 (IDR+Ara-C) |                        | 癌種                               | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説      | 成人急性前骨髄球性白血病に対する汎用化学療法。              | 1コース                   | 内服・その他内容                         |            |
|         |                                      | 28日                    | トレチノイン 45mg/m <sup>2</sup> 経口 分3 |            |
| 備考      |                                      | 催吐リスク                  |                                  |            |
|         |                                      | 中                      |                                  |            |
| 薬剤名     | 投与量                                  | 手技                     | 投与スケジュール                         |            |
| イダルビシン  | 12mg/m <sup>2</sup>                  | 30分で点滴                 | day1-3                           |            |
| シタラビン①  | 50mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴                | day1-7                           |            |
| シタラビン②  | 50mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴<br>①と②は12時間空ける | day1-7                           |            |
| レジメン名   | 【臨】 JALSG APL212 寛解導入 D群 (A→D)       |                        | 癌種                               | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説      | 急性前骨髄球性白血病に対する汎用化学療法。                | 1コース                   | 内服・その他内容                         |            |
|         |                                      | 7日                     | 治療前の末梢血白血球数およびAPL細胞数によりA,B,C群    |            |
| 備考      | A群施行時                                | 催吐リスク                  | により治療を開始し、途中APL細胞数が増加した場合にD      |            |
|         |                                      | 中                      | 群として追加療法を行う。                     |            |
| 薬剤名     | 投与量                                  | 手技                     | 投与スケジュール                         |            |
| イダルビシン  | 12mg/m <sup>2</sup>                  | 30分で点滴                 | day1-3                           |            |
| シタラビン   | 50mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴                | day1-7                           |            |
| シタラビン   | 50mg/m <sup>2</sup>                  | 12時間で点滴                | day1-7                           |            |
| レジメン名   | 【臨】 JALSG APL204 地固めC2               |                        | 癌種                               | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説      | 急性前骨髄性白血病 (APL) の治療法                 | 1コース                   | 内服・その他内容                         |            |
|         |                                      | 21日                    |                                  |            |
| 備考      |                                      | 催吐リスク                  |                                  |            |
|         |                                      | 中                      |                                  |            |
| 薬剤名     | 投与量                                  | 手技                     | 投与スケジュール                         |            |
| ダウノルビシン | 50mg/m <sup>2</sup>                  | 30分で点滴                 | day1-3                           |            |
| シタラビン①  | 100mg/m <sup>2</sup>                 | 12時間で点滴                | day1-5                           |            |
| シタラビン②  | 100mg/m <sup>2</sup>                 | 12時間で点滴<br>①と②は12時間空ける | day1-5                           |            |
| レジメン名   | 【臨】 JALSG APL212 寛解導入 D群 (C→D)       |                        | 癌種                               | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説      | 急性前骨髄球性白血病に対する汎用化学療法。                | 1コース                   | 内服・その他内容                         |            |
|         |                                      | 1日                     | 治療前の末梢血白血球数およびAPL細胞数によりA,B,C群    |            |
| 備考      | C群施行時                                | 催吐リスク                  | により治療を開始し、途中APL細胞数が増加した場合にD      |            |
|         |                                      | 中                      | 群として追加療法を行う。                     |            |
| 薬剤名     | 投与量                                  | 手技                     | 投与スケジュール                         |            |
| イダルビシン  | 12mg/m <sup>2</sup>                  | 30分で点滴                 | day1                             |            |
| レジメン名   | 【臨】 JALSG APL212 地固め 1コース, 3コース      |                        | 癌種                               | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説      | 再発または難治性の急性前骨髄球性白血病に対しての治療法          | 1コース                   | 内服・その他内容                         |            |
|         |                                      | 35日                    |                                  |            |
| 備考      |                                      | 催吐リスク                  |                                  |            |
|         |                                      | 中                      |                                  |            |
| 薬剤名     | 投与量                                  | 手技                     | 投与スケジュール                         |            |
| 三酸化ヒ素   | 0.15mg/kg                            | 120分で点滴                | day1-5,8-12,15-19,22-26,29-33    |            |

|           |   |                        |   |            |
|-----------|---|------------------------|---|------------|
| レジメン名     | APL 地固め 三酸化二ヒ素+ATRA                       |                        | 癌種  | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説        | 再発または難治性の急性前骨髄球性白血病に対する治療法                | 1コース                   | 内服・その他内容<br>トレチノイン 45mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-15,29-43 |            |
|           |   | 56日                    |   |            |
| 備考        | 4コース繰り返す                                  | 催吐リスク                  | 4コース目はday1-15のみ投与とする。                                     |            |
|           |   | 中                      |   |            |
| 薬剤名       | 投与量                                       | 手技                     | 投与スケジュール  |            |
| 三酸化二ヒ素    | 0.15mg/kg                                 | 120分で点滴                | day1-5,8-12,15-19,22-26                                   |            |
| レジメン名     | 【臨】 JALSG APL204 寛解導入 D群 (IDR+Ara-C+ATRA) |                        | 癌種  | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説        | 急性前骨髄性白血病に対する汎用化学療法。                      | 1コース                   | 内服・その他内容<br>トレチノイン 45mg/m <sup>2</sup> 経口 分3              |            |
|           |   | 28日                    |   |            |
| 備考        |   | 催吐リスク                  |   |            |
|           |   | 中                      |   |            |
| 薬剤名       | 投与量                                       | 手技                     | 投与スケジュール  |            |
| イダルビシン    | 12mg/m <sup>2</sup>                       | 30分で点滴                 | day1-3  |            |
| シタラビン①    | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 12時間で点滴                | day1-7  |            |
| シタラビン②    | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 12時間で点滴<br>①と②は12時間空ける | day1-7  |            |
| レジメン名     | 【臨】 JALSG APL204 地固めC3                    |                        | 癌種  | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説        | 急性前骨髄性白血病 (APL) の治療法                      | 1コース                   | 内服・その他内容  |            |
|           |   | 21日                    |   |            |
| 備考        |   | 催吐リスク                  |   |            |
|           |   | 中                      |   |            |
| 薬剤名       | 投与量                                       | 手技                     | 投与スケジュール  |            |
| イダルビシン    | 12mg/m <sup>2</sup>                       | 30分で点滴                 | day1-3  |            |
| シタラビン①    | 70mg/m <sup>2</sup>                       | 12時間で点滴                | day1-5  |            |
| シタラビン②    | 70mg/m <sup>2</sup>                       | 12時間で点滴<br>①と②は12時間空ける | day1-5  |            |
| レジメン名     | 【臨】 JALSG APL212 寛解導入 C群                  |                        | 癌種  | 急性前骨髄球性白血病 |
| 解説        | 急性前骨髄球性白血病に対する汎用化学療法。                     | 1コース                   | 内服・その他内容  |            |
|           |   | 7日                     |   |            |
| 備考        |   | 催吐リスク                  |   |            |
|           |   | 中                      |   |            |
| 薬剤名       | 投与量                                       | 手技                     | 投与スケジュール  |            |
| イダルビシン    | 12mg/m <sup>2</sup>                       | 30分で点滴                 | day1-3  |            |
| シタラビン     | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 12時間で点滴                | day1-7  |            |
| シタラビン     | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 12時間で点滴                | day1-7  |            |
| レジメン名     | 【臨】 JALSG B-ALL97 レジメンA (コース1,3,5)        |                        | 癌種  | 急性リンパ性白血病  |
| 解説        | JALSG 成人急性リンパ性白血病治療プロトコール                 | 1コース                   | 内服・その他内容  |            |
|           |   | 21日                    |   |            |
| 備考        | JALSG B-ALL97 髄注のレジメンと併用する。               | 催吐リスク                  |   |            |
|           |   | 中                      |   |            |
| 薬剤名       | 投与量                                       | 手技                     | 投与スケジュール  |            |
| シクロホスファミド | 200mg/m <sup>2</sup>                      | 60分で点滴                 | day1-5  |            |
| メトトレキサート① | 100mg/m <sup>2</sup>                      | 120分で点滴                | day1  |            |
| メトトレキサート② | 400mg/m <sup>2</sup>                      | 22時間で点滴                | day1  |            |
| ピンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴                 | day2  |            |
| ドキシルビシン   | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 3時間で点滴                 | day5  |            |

|       |                                      |                       |   |                         |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| レジメン名 | Hyper-CVAD 1,3,5,7コース                |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病               |
| 解説    | 毒性を考慮した急性リンパ性白血病に対する汎用化学療法           | 1コース                  | 内服・その他内容  |                         |
|       | の1つ。                                 | 21日                   |   |                         |
| 備考    | Hyper-CVAD 髄注のレジメンと併用する。             | 催吐リスク<br>中            |   |                         |
|       | 薬剤名                                  | 投与量                   | 手技  | 投与スケジュール                |
|       | シクロホスファミド①                           | 300mg/m <sup>2</sup>  | 3時間で点滴  | day1-3                  |
|       | ビンクリスチン                              | 2mg/body              | 10分で点滴  | day4,11                 |
|       | ドキシソルピシン                             | 50mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴  | day4                    |
|       | シクロホスファミド②                           | 300mg/m <sup>2</sup>  | 3時間で点滴<br>②は①と12時間空ける                                     | day1-3                  |
| レジメン名 | 【臨】 JALSG B-ALL97 髄注                 |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病               |
| 解説    | JALSG 成人急性リンパ性白血病治療プロトコール            | 1コース                  | 内服・その他内容  |                         |
| 備考    |                                      | 催吐リスク<br>最小           |   |                         |
|       | 薬剤名                                  | 投与量                   |   |                         |
|       | メトトレキサート                             | 15mg/body             | 髄注  | day1<br>(コース2,3はday1,5) |
| レジメン名 | 【臨】 JALSG ALL202-O 地固め3コース目 脳脊髄腔注    |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病               |
| 解説    | 急性リンパ性白血病に対する治療法。                    | 1コース                  | 内服・その他内容  |                         |
|       |                                      | 42日                   |   |                         |
| 備考    | day1,29に脳脊髄腔注射を行う。                   | 催吐リスク<br>最小           |   |                         |
|       | 薬剤名                                  | 投与量                   | 手技  | 投与スケジュール                |
|       | シタラビン                                | 40mg/body             | 脳脊髄腔注   | day1,29                 |
|       | メトトレキサート                             | 15mg/body             | 脳脊髄腔注   | day1,29                 |
| レジメン名 | 【臨】 ALL202-O 地固め2コース目 (A)            |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病               |
| 解説    | 急性リンパ性白血病に対する治療法。                    | 1コース                  | 内服・その他内容<br>メルカプトプリン水和物 25mg/m <sup>2</sup> 経口 分1 day1-21 |                         |
|       |                                      | 21日                   |   |                         |
| 備考    |                                      | 催吐リスク<br>高            |   |                         |
|       | 薬剤名                                  | 投与量                   | 手技  | 投与スケジュール                |
|       | ビンクリスチン                              | 1.3mg/m <sup>2</sup>  | 10分で点滴  | day1,15                 |
|       | メトトレキサート                             | 3000mg/m <sup>2</sup> | 24時間で点滴   | day1,15                 |
|       | メトトレキサート                             | 15mg/body             | 髄注  | day1,15                 |
| レジメン名 | 【臨】 JALSG Ph+ALL208 IMA 地固め1 60-64歳  |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病               |
| 解説    | フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対する汎用化学療法の1つ。 | 1コース                  | 内服・その他内容<br>イマチニブ 600mg/body 経口分1 day4-28                 |                         |
|       |                                      | 28日                   |   |                         |
| 備考    | JALSG Ph+ALL208 髄注のレジメンと併用する。        | 催吐リスク<br>中            |   |                         |
|       | 薬剤名                                  | 投与量                   | 手技  | 投与スケジュール                |
|       | メトトレキサート                             | 100mg/m <sup>2</sup>  | 1時間で点滴  | day1                    |
|       | メトトレキサート                             | 900mg/m <sup>2</sup>  | 23時間で点滴   | day1                    |
|       | シタラビン①                               | 1000mg/m <sup>2</sup> | 3時間で点滴  | day2,3                  |
|       | シタラビン②                               | 1000mg/m <sup>2</sup> | 3時間で点滴<br>②は①と12時間空ける                                     | day2,3                  |

|              |                                     |                       |   |           |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| レジメン名        | 【臨】 JALSG Ph+ALL208 IMA 地固め2 15-64歳 |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説           | Ph+急性リンパ性白血病に対する地固め療法。              | 1コース                  | 内服・その他内容<br>イマチニブメシル酸塩 600mg 経口 分1 day2-21              |           |
|              |                                     | 28日                   |   |           |
| 備考           | JALSG Ph+ALL208 髄注のレジメンと併用する。       | 催吐リスク                 | プレドニゾン 60mg/m <sup>2</sup> 経口 day1-7                    |           |
|              |                                     | 中                     |   |           |
| 薬剤名          | 投与量                                 | 手技                    | 投与スケジュール  |           |
| シクロホスファミド    | 1200mg/m <sup>2</sup>               | 3時間で点滴                | day1  |           |
| ダウノルビシン      | 60mg/m <sup>2</sup>                 | 1時間で点滴                | day1  |           |
| ピンクリスチン      | 1.3mg/m <sup>2</sup>                | 10分で点滴                | day1  |           |
| レジメン名        | 【臨】 JALSG Ph+ALL213 地固めC1           |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説           | Ph+急性リンパ性白血病の標準的治療の1つ。              | 1コース                  | 内服・その他内容<br>ダサチニブ 100mg/day 経口分1 day4-24                |           |
|              |                                     | 31日                   |   |           |
| 備考           | JALSG Ph+ALL213地固めC1（髄注）のレジメンと併用する。 | 催吐リスク                 |   |           |
|              |                                     | 中                     |   |           |
| 薬剤名          | 投与量                                 | 手技                    | 投与スケジュール  |           |
| メトトレキサート     | 100mg/m <sup>2</sup>                | 1時間で点滴                | day1  |           |
| メトトレキサート     | 900mg/m <sup>2</sup>                | 23時間で点滴               | day1  |           |
| シタラビン①       | 2000mg/m <sup>2</sup>               | 3時間で点滴                |   |           |
| シタラビン②       | 2000mg/m <sup>2</sup>               | 3時間で点滴<br>②は①と12時間空ける |   |           |
| レジメン名        | Hyper-CVAD 2,4,6,8コース               |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説           | 毒性を考慮した急性リンパ性白血病に対する汎用化学療法<br>の1つ。  | 1コース                  | 内服・その他内容  |           |
|              |                                     | 21日                   |   |           |
| 備考           | Hyper-CVAD 髄注のレジメンと併用する。            | 催吐リスク                 |   |           |
|              |                                     | 中                     |   |           |
| 薬剤名          | 投与量                                 | 手技                    | 投与スケジュール  |           |
| メトトレキサート①, ② | 200, 800mg/m <sup>2</sup>           | 2, 24時間で点滴            | day1  |           |
| シタラビン①       | 3000mg/m <sup>2</sup>               | 3時間で点滴                | day2-3  |           |
| シタラビン②       | 3000mg/m <sup>2</sup>               | 3時間で点滴<br>①と②は12時間空ける | day2-3  |           |
| レジメン名        | Hyper-CVAD 髄注                       |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説           | 毒性を考慮した急性リンパ性白血病に対する汎用化学療法<br>の1つ。  | 1コース                  | 内服・その他内容  |           |
|              |                                     | 21日                   |   |           |
| 備考           |                                     | 催吐リスク                 |   |           |
|              |                                     | 最小                    |   |           |
| 薬剤名          | 投与量                                 | 手技                    | 投与スケジュール  |           |
| メトトレキサート     | 12mg/body                           | 髄注                    | day2  |           |
| シタラビン        | 70mg/body                           | 髄注                    | day8  |           |
| レジメン名        | 【臨】 JALSG B-ALL97 PREFASE           |                       | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説           | JALSG成人急性リンパ性白血病治療プロトコール            | 1コース                  | 内服・その他内容<br>プレドニゾン 100mg/body 経口分3 (60-30-10)<br>day1-5 |           |
|              |                                     | 5日                    |   |           |
| 備考           |                                     | 催吐リスク                 |   |           |
|              |                                     | 中                     |   |           |
| 薬剤名          | 投与量                                 | 手技                    | 投与スケジュール  |           |
| シクロホスファミド    | 200mg/m <sup>2</sup>                | 60分で点滴                | day1-5  |           |

|            |  |         |   |           |
|------------|--|---------|---|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JALSG ALL202-O 寛解導入 25歳以上60歳未満     |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | 25歳以上60歳未満のALL患者に対する治療プロトコル。           | 1コース    | 内服・その他内容                                      |           |
|            |  | 28日     |   |           |
| 備考         |  | 催吐リスク   |   |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量                                    | 手技      | 投与スケジュール                                      |           |
| シクロホスファミド  | 1200mg/m <sup>2</sup>                  | 3時間で点滴  | day1  |           |
| ダウノルビシン    | 60mg/m <sup>2</sup>                    | 1時間で点滴  | day1-3  |           |
| ピンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                   | 10分で点滴  | day1,8,15,22                                  |           |
| L-アスパラギナーゼ | 3000K.U./m <sup>2</sup>                | 2時間で点滴  | day9,11,13,16,18,20                           |           |
| レジメン名      | 【臨】 JALSG B-ALL97 レジメンB (コース2,4,6)     |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JALSG 成人急性リンパ性白血病治療プロトコル               | 1コース    | 内服・その他内容                                      |           |
|            |  | 21日     |   |           |
| 備考         | JALSG B-ALL97 髄注のレジメンと併用する。            | 催吐リスク   |   |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量                                    | 手技      | 投与スケジュール                                      |           |
| シクロホスファミド  | 200mg/m <sup>2</sup>                   | 60分で点滴  | day1-5  |           |
| メトトレキサート①  | 100mg/m <sup>2</sup>                   | 120分で点滴 | day1  |           |
| メトトレキサート②  | 400mg/m <sup>2</sup>                   | 22時間で点滴 | day1  |           |
| ピンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                   | 10分で点滴  | day2  |           |
| エトポシド      | 100mg/m <sup>2</sup>                   | 60分で点滴  | day2-5  |           |
| レジメン名      | 【臨】 JALSG ALL202-O 寛解導入 60歳以上          |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | 60歳以上のALL患者に対する治療プロトコル。                | 1コース    | 内服・その他内容                                      |           |
|            |  | 28日     |   |           |
| 備考         |  | 催吐リスク   |   |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量                                    | 手技      | 投与スケジュール                                      |           |
| シクロホスファミド  | 800mg/m <sup>2</sup>                   | 3時間で点滴  | day1  |           |
| ダウノルビシン    | 30mg/m <sup>2</sup>                    | 1時間で点滴  | day1-3  |           |
| ピンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                   | 10分で点滴  | day1,8,15,22                                  |           |
| L-アスパラギナーゼ | 3000K.U./m <sup>2</sup>                | 2時間で点滴  | day9,11,13,16,18,20                           |           |
| レジメン名      | 【臨】 JALSG ALL202-O 地固め2コース目 (B)        |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | 急性リンパ性白血病に対する治療法。                      | 1コース    | 内服・その他内容                                      |           |
|            |  | 21日     |   |           |
| 備考         |  | 催吐リスク   | メルカプトプリン水和物 25mg/m <sup>2</sup> 経口 分1 day1-21 |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量                                    | 手技      | 投与スケジュール                                      |           |
| ピンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                   | 10分で点滴  | day1,15                                       |           |
| メトトレキサート①  | 100mg/m <sup>2</sup>                   | 2時間で点滴  | day1,15                                       |           |
| メトトレキサート②  | 400mg/m <sup>2</sup>                   | 22時間で点滴 | day1,15                                       |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body                              | 髄注      | day1,15                                       |           |
| レジメン名      | 【臨】 JALSG ALL202-U 地固め 15歳以上25歳未満 6-9w |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | 急性リンパ性白血病に対する地固め療法                     | 1コース    | 内服・その他内容                                      |           |
|            |  | 28日     |   |           |
| 備考         | ALL202-U 6-9w 髄注のレジメンと併用する。            | 催吐リスク   | メルカプトプリン水和物 50mg/m <sup>2</sup> 経口 分1 day1-14 |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量                                    | 手技      | 投与スケジュール                                      |           |
| シクロホスファミド  | 750mg/m <sup>2</sup>                   | 60分で点滴  | day1,8  |           |
| ピラルビシン     | 25mg/m <sup>2</sup>                    | 60分で点滴  | day1,2  |           |
| シタラビン      | 75mg/m <sup>2</sup>                    | 60分で点滴  | day1-6,8-13                                   |           |

|          |                              |       |          |           |
|----------|------------------------------|-------|----------|-----------|
| レジメン名    | 【臨】 JALSG ALL202 地固め1コース目 髄注 |       | 癌種       | 急性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考 | ALL地固め療法 1 コース目 day1に行う髄注    | 1コース  | 内服・その他内容 |           |
|          |                              | 催吐リスク |          |           |
|          |                              | 最小    |          |           |
| 薬剤名      | 投与量                          | 手技    | 投与スケジュール |           |
| メトトレキサート | 15mg/body                    | 髄注    | day1     |           |

|                           |  |   |                            |           |
|---------------------------|--|---|----------------------------|-----------|
| レジメン名                     | 【臨】 JALSG ALL202 地固め1コース目  |   | 癌種                         | 急性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考                  | 急性リンパ性白血病に対する治療法。  | 1コース                                      | 内服・その他内容                   |           |
|                           |  | 催吐リスク                                     |                            |           |
|                           |  | 中   |                            |           |
| 薬剤名                       | 投与量  | 手技  | 投与スケジュール                   |           |
| シタラビン①<br>エトポシド<br>シタラビン② | 2000mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup><br>2000mg/m <sup>2</sup> | 3時間で点滴<br>60分で点滴<br>3時間で点滴<br>②は①と12時間空ける | day1-3<br>day1-3<br>day1-3 |           |

|                   |                                  |             |              |           |
|-------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| レジメン名             | 【臨】 JALSG Ph+ALL208 IMA 地固め (髄注) |             | 癌種           | 急性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考          | Ph+急性リンパ性白血病に対する地固め療法。           | 1コース        | 内服・その他内容     |           |
|                   |                                  | 28日         |              |           |
|                   | JALSG Ph+ALL208のレジメンと併用する。       | 催吐リスク<br>最小 |              |           |
| 薬剤名               | 投与量                              | 手技          | 投与スケジュール     |           |
| メトトレキサート<br>シタラビン | 15mg/body<br>40mg/body           | 髄注<br>髄注    | day1<br>day1 |           |

|  |   |                                  |  |           |
|--|---|----------------------------------|--|-----------|
| レジメン名                                      | 【臨】 JALSG ALL202-U 寛解導入 15歳以上25歳未満 1-5  |                                  | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考                                   | 急性リンパ性白血病に対する寛解導入法  | 1コース                             | 内服・その他内容<br>プレドニゾロン 60mg/m <sup>2</sup> 経口 分2 day1-7 |           |
|  |   | 35日                              |  |           |
|  | ALL202-U 1-5w 髄注のレジメンと併用する。   | 催吐リスク<br>中                       |  |           |
| 薬剤名  | 投与量   | 手技                               | 投与スケジュール   |           |
| メトトレキサート<br>ピンクリスチン<br>ピラルビシン<br>シクロホスファミド | 12mg/body<br>1.5mg/m <sup>2</sup><br>25mg/m <sup>2</sup><br>1200mg/m <sup>2</sup> | 髄注<br>10分で点滴<br>60分で点滴<br>60分で点滴 | day1<br>day8,15,22,29<br>day8,9<br>day10             |           |

|   |  |                                      |   |           |
|---|--|--------------------------------------|---|-----------|
| レジメン名                                     | 【臨】 JALSG ALL202-O 地固め3コース目  |                                      | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考                                  | 急性リンパ性白血病に対する治療法。  | 1コース                                 | 内服・その他内容  |           |
|   |  | 42日                                  |   |           |
|   | day1,29に脳脊髄腔注射を行う。   | 催吐リスク<br>中                           |   |           |
| 薬剤名                                       | 投与量  | 手技                                   | 投与スケジュール  |           |
| ピンクリスチン<br>ドキシソルビシン<br>シクロホスファミド<br>シタラビン | 1.3mg/m <sup>2</sup><br>30mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup> | 10分で点滴<br>1時間で点滴<br>3時間で点滴<br>1時間で点滴 | day1,8,15<br>day1,8,15<br>day29<br>day29-33,36-40 |           |



|            |   |           |  |           |
|------------|---|-----------|--|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 16-35歳 B-1(B-2)                        |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。           | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日       |  |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する地固めB-1(B-2) Ara-C 大量療法 (16-35歳)           | 催吐リスク     |  |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン      | 2000mg/m <sup>2</sup>                               | 3時間で点滴    | day1-4   |           |
| ミトキサントロン   | 10mg/m <sup>2</sup>                                 | 30分で点滴    | day2,3   |           |
| L-アスパラギナーゼ | 10000K.U./m <sup>2</sup>                            | 4時間で点滴    | day5   |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body   | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body  | 髄注        | day1   |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 P-B1                            |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。           | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日       |  |           |
| 備考         | Ph+ALLに対する地固めP-B1 ponatinib + Ara-C 大量療法 (16-55歳)   | 催吐リスク     | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14<br>30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ：30mg/body 分1 MRD陰性確認でき次第、 |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン      | 2000mg/m <sup>2</sup>                               | 3時間で点滴    | day1-4   |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body   | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body  | 髄注        | day1   |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 P-C1(C2)                        |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。           | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日       |  |           |
| 備考         | Ph+ALLに対する地固めP-C1(C2) ponatinib + MTX 大量療法 (16-55歳) | 催吐リスク     | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14<br>30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ：30mg/body 分1 MRD陰性確認でき次第、 |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| ピンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                | 10分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート   | 200mg/m <sup>2</sup>                                | 30分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート   | 1800mg/m <sup>2</sup>                               | 23.5時間で点滴 | day1,15  |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body   | 髄注        | day1,15  |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body  | 髄注        | day1,15  |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 P-B2                            |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。           | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日       |  |           |
| 備考         | Ph+ALLに対する地固めP-B2 ponatinib + Ara-C 大量療法 (16-55歳)   | 催吐リスク     | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14<br>30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ：30mg/body 分1 MRD陰性確認でき次第、 |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン      | 2000mg/m <sup>2</sup>                               | 3時間で点滴    | day1-4   |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body   | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body  | 髄注        | day1   |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph+ 56-65歳 P-B1                            |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。           | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日       |  |           |
| 備考         | Ph+ALLに対する地固めP-B1 ponatinib + Ara-C 大量療法 (56-65歳)   | 催吐リスク     | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14<br>30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ：30mg/body 分1 MRD陰性確認でき次第、 |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン      | 1500mg/m <sup>2</sup>                               | 3時間で点滴    | day1-4   |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body   | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body  | 髄注        | day1   |           |



|           |   |           |  |           |
|-----------|---|-----------|--|-----------|
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 56-65歳 P-C1(C2)                          |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。             | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|           |   | 28日       | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14                             |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めP-C1(C2) ponatinib + MTX 大量療法 (56-65歳)   | 催吐リスク     | 30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ：30mg/body 分1 MRD陰性確認でき次第、 |           |
|           |   | 中         |  |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| ピンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                  | 10分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート  | 150mg/m <sup>2</sup>                                  | 30分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート  | 1350mg/m <sup>2</sup>                                 | 23.5時間で点滴 | day1,15  |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1,15  |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1,15  |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 56-65歳 P-D                               |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。             | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|           |   | 28日       | プレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-7 以降漸減                 |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めP-D ponatinib + DNR-COP 療法 (56-65歳)      | 催吐リスク     | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14                             |           |
|           |   | 中         | 30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ                           |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| ダウノルビシン   | 50mg/m <sup>2</sup>                                   | 30分で点滴    | day1   |           |
| シクロホスファミド | 500mg/m <sup>2</sup>                                  | 60分で点滴    | day1   |           |
| ピンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                  | 10分で点滴    | day1   |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1   |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 D-B1(B2)                          |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。             | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|           |   | 28日       | ダサチニブ：100mg/body 分1 day1-                                    |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めD-B1(B2) dasatinib + Ara-C 大量療法 (16-55歳) | 催吐リスク     | 増悪時：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14                               |           |
|           |   | 中         | 30mg/body 分1 day15- MRD陰性確認でき次第：                             |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン     | 2000mg/m <sup>2</sup>                                 | 3時間で点滴    | day1-4   |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1   |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 D-C1(C2)                          |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。             | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|           |   | 28日       | ダサチニブ：100mg/body 分1 day1-                                    |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めD-C1(C2) dasatinib + MTX 大量療法 (16-55歳)   | 催吐リスク     | 増悪時：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14                               |           |
|           |   | 中         | 30mg/body 分1 day15- MRD陰性確認でき次第：                             |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| ピンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                  | 10分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート  | 200mg/m <sup>2</sup>                                  | 30分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート  | 1800mg/m <sup>2</sup>                                 | 23.5時間で点滴 | day1,15  |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1,15  |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1,15  |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 56-65歳 P-B2                              |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。             | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|           |   | 28日       | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14                             |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めP-B2 ponatinib + Ara-C 大量療法 (56-65歳)     | 催吐リスク     | 30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ：30mg/body 分1 MRD陰性確認でき次第、 |           |
|           |   | 中         |  |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン     | 1500mg/m <sup>2</sup>                                 | 3時間で点滴    | day1-4   |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1   |           |

|           |   |           |  |           |
|-----------|---|-----------|--|-----------|
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 D-D                                   |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。                 | 1コース      | 内服・その他内容                                   |           |
|           |   | 28日       | ブレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-7 以降漸減 |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めD-D dasatinib + DNR-COP 療法<br>(16-55歳)       | 催吐リスク     | ダサチニブ：100mg/body 分1 day1-                  |           |
|           |   | 中         | 増悪時：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14             |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール                                   |           |
| ダウノルビシン   | 50mg/m <sup>2</sup>                                       | 30分で点滴    | day1                                       |           |
| シクロホスファミド | 1000mg/m <sup>2</sup>                                     | 60分で点滴    | day1                                       |           |
| ビンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                      | 10分で点滴    | day1                                       |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1                                       |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1                                       |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 D-M                                   |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。                 | 1コース      | 内服・その他内容                                   |           |
|           |   | 28日       | ブレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-5 以降漸減 |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する維持D-M (16-65歳)                                  | 催吐リスク     | ダサチニブ：100mg/body 分1 day1-                  |           |
|           |   | 最小        | 増悪時：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14             |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール                                   |           |
| ビンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                      | 10分で点滴    | day1                                       |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 56-65歳 D-B1(B2)                              |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。                 | 1コース      | 内服・その他内容                                   |           |
|           |   | 28日       | ダサチニブ：100mg/body 分1 day1-                  |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めD-B1(B2) dasatinib + Ara-C 大<br>量療法 (56-65歳) | 催吐リスク     | 増悪時：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14             |           |
|           |   | 中         | 30mg/body 分1 day15- MRD陰性確認でき次第：           |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール                                   |           |
| シタラビン     | 1500mg/m <sup>2</sup>                                     | 3時間で点滴    | day1-4                                     |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1                                       |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1                                       |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 56-65歳 D-C1(C2)                              |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。                 | 1コース      | 内服・その他内容                                   |           |
|           |   | 28日       | ダサチニブ：100mg/body 分1 day1-                  |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めD-C1(C2) dasatinib + MTX 大量<br>療法 (56-65歳)   | 催吐リスク     | 増悪時：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14             |           |
|           |   | 中         | 30mg/body 分1 day15- MRD陰性確認でき次第：           |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール                                   |           |
| ビンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                      | 10分で点滴    | day1,15                                    |           |
| メトトレキサート  | 150mg/m <sup>2</sup>                                      | 30分で点滴    | day1,15                                    |           |
| メトトレキサート  | 1350mg/m <sup>2</sup>                                     | 23.5時間で点滴 | day1,15                                    |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1,15                                    |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1,15                                    |           |
| レジメン名     | 【臨】 JSCT ステロイドプリフェイス用髄注                                   |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説        | 急性リンパ性白血病に対する治療法。   | 1コース      | 内服・その他内容                                   |           |
|           |   | 28日       | ブレドニゾロン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-7    |           |
| 備考        |   | 催吐リスク     |  |           |
|           |   | 最小        |  |           |
| 薬剤名       | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール                                   |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body   | 髄注        | day1                                       |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body  | 髄注        | day1                                       |           |

|            |   |           |  |           |
|------------|---|-----------|--|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 36-55歳 A-1(A-2)              |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療               | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            | プロトコールの1つ。                                | 28日       | プレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-20 以降漸減                              |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する寛解導入療法A1 (36-55歳)               | 催吐リスク     |  |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シクロホスファミド  | 1000mg/m <sup>2</sup>                     | 60分で点滴    | day1   |           |
| ダウノルビシン    | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 30分で点滴    | day1-3   |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴    | day1,8,15,22   |           |
| L-アスパラギナーゼ | 3000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴    | day9,11,13,16,18,20  |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 56-65歳 M-1                   |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療               | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            | プロトコールの1つ。                                | 28日       | メルカプトプリン：30mg/m <sup>2</sup> 分1 day1-<br>メトトレキサート：20mg/m <sup>2</sup> 週1 |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する寛解導入療法A2 (56-65歳)               | 催吐リスク     | プレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-5                                    |           |
|            |   | 最小        |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴    | day1   |           |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                   | 筋注        | day1   |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 36-55歳 C-1(C-2)              |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療               | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            | プロトコールの1つ。                                | 28日       | 【髄注】   |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する地固めC-1(C-2) CNS予防 (56-65歳)      | 催吐リスク     | メトトレキサート：15mg/body 髄注 day1,15  |           |
|            |   | 中         | デキサメタゾン：3.3mg/body 髄注 day1,15  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート   | 150mg/m <sup>2</sup>                      | 30分で点滴    | day1,15  |           |
| メトトレキサート   | 1350mg/m <sup>2</sup>                     | 23.5時間で点滴 | day1,15  |           |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴    | day2,16  |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 56-65歳 B-1(B-2)              |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療               | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            | プロトコールの1つ。                                | 28日       |  |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する地固めB-1(B-2) Ara-C 大量療法 (56-65歳) | 催吐リスク     |  |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン      | 1500mg/m <sup>2</sup>                     | 3時間で点滴    | day1-4   |           |
| ミトキサントロン   | 7mg/m <sup>2</sup>                        | 30分で点滴    | day2,3   |           |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴    | day5   |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body                                 | 髄注        | day1   |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body                                | 髄注        | day1   |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 56-65歳 A-1(A-2)              |           | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療               | 1コース      | 内服・その他内容   |           |
|            | プロトコールの1つ。                                | 28日       | プレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-20 以降漸減                              |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する寛解導入療法A1 (56-65歳)               | 催吐リスク     |  |           |
|            |   | 中         |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技        | 投与スケジュール   |           |
| シクロホスファミド  | 500mg/m <sup>2</sup>                      | 60分で点滴    | day1   |           |
| ダウノルビシン    | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 30分で点滴    | day1-3   |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴    | day1,8,15,22   |           |
| L-アスパラギナーゼ | 3000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴    | day9,11,13,16,18,20  |           |

|            |  |         |   |           |
|------------|--|---------|---|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 36-55歳 M-1                          |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療                      | 1コース    | 内服・その他内容                                  |           |
|            | プロトコールの1つ。                                       | 28日     | メルカプトプリン：40mg/m <sup>2</sup> 分1 day1-     |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する維持療法M-1 (36-55歳)                       | 催吐リスク   | メトトレキサート：20mg/m <sup>2</sup> 週1           |           |
|            |  | 最小      | プレドニゾン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-5      |           |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技      | 投与スケジュール                                  |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴  | day1                                      |           |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                          | 筋注      | day1                                      |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph+ 56-65歳 D-D                          |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療                      | 1コース    | 内服・その他内容                                  |           |
|            | プロトコールの1つ。                                       | 28日     | プレドニゾン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-7以降漸減  |           |
| 備考         | Ph+ALLに対する地固めD-D dasatinib + DNR-COP 療法 (56-65歳) | 催吐リスク   | ダサチニブ：100mg/body 分1 day1-                 |           |
|            |  | 中       | 増悪時：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14            |           |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技      | 投与スケジュール                                  |           |
| ダウノルビシン    | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴  | day1                                      |           |
| シクロホスファミド  | 500mg/m <sup>2</sup>                             | 60分で点滴  | day1                                      |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴  | day1                                      |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body  | 髄注      | day1                                      |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body                                       | 髄注      | day1                                      |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 36-55歳 B-1(B-2)                     |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療                      | 1コース    | 内服・その他内容                                  |           |
|            | プロトコールの1つ。                                       | 28日     |   |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する地固めB-1(B-2) Ara-C 大量療法 (36-55歳)        | 催吐リスク   |   |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技      | 投与スケジュール                                  |           |
| シタラビン      | 2000mg/m <sup>2</sup>                            | 3時間で点滴  | day1-4                                    |           |
| ミトキサントロン   | 10mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴  | day2,3                                    |           |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                          | 4時間で点滴  | day5                                      |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body  | 髄注      | day1                                      |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body                                       | 髄注      | day1                                      |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 16-35歳 A-1                          |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療                      | 1コース    | 内服・その他内容                                  |           |
|            | プロトコールの1つ。                                       | 28日     | プレドニゾン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-20以降漸減 |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する寛解導入療法A1 (16-35歳)                      | 催吐リスク   |   |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技      | 投与スケジュール                                  |           |
| シクロホスファミド  | 1000mg/m <sup>2</sup>                            | 60分で点滴  | day1                                      |           |
| ダウノルビシン    | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴  | day1-3                                    |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴  | day1,8,15,22                              |           |
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 16-65歳 45kg以上                       |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療                      | 1コース    | 内服・その他内容                                  |           |
|            | プロトコールの1つ。                                       | 43日     |   |           |
| 備考         | Ph-ALLに対するブリナツモマブ療法体重45kg以上(16-65歳)              | 催吐リスク   |   |           |
|            |  | 軽       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技      | 投与スケジュール                                  |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body  | 髄注      | 1Cday1,2Cday29                            |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body                                       | 髄注      |   |           |
| ブリナツモマブ    | 9μg/m <sup>2</sup>                               | 24時間で点滴 | 1Cday2-8                                  |           |
| ブリナツモマブ    | 28μg/m <sup>2</sup>                              | 24時間で点滴 | 1Cday9-29,2Cday1-28<br>C=コース              |           |

| レジメン名    | 【臨】 JSCT Ph- 16-65歳 45kg未満                |         | 癌種                           | 急性リンパ性白血病 |
|----------|---|---------|------------------------------|-----------|
| 解説       | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。 | 1コース    | 内服・その他内容                     |           |
|          |   | 43日     |                              |           |
| 備考       | Ph-ALLに対するブリナツモマブ療法体重45kg未満(16-65歳)       | 催吐リスク   |                              |           |
|          |   | 軽       |                              |           |
| 薬剤名      | 投与量                                       | 手技      | 投与スケジュール                     |           |
| メトトレキサート | 15mg/body                                 | 髄注      | 1Cday1,2Cday29               |           |
| デキサメタゾン  | 3.3mg/body                                | 髄注      |                              |           |
| ブリナツモマブ  | 5µg/m <sup>2</sup>                        | 24時間で点滴 | 1Cday2-8                     |           |
| ブリナツモマブ  | 15µg/m <sup>2</sup>                       | 24時間で点滴 | 1Cday9-29,2Cday1-28<br>C=コース |           |

| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 16-35歳 M-1                   |        | 癌種                                    | 急性リンパ性白血病 |
|------------|---|--------|---------------------------------------|-----------|
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。 | 1コース   | 内服・その他内容                              |           |
|            |   | 28日    | メルカプトプリン：50mg/m <sup>2</sup> 分1 day1- |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する維持療法M-1 (16-35歳)                | 催吐リスク  | メトトレキサート：20mg/m <sup>2</sup> 週1       |           |
|            |   | 最小     | プレドニゾン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-5  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技     | 投与スケジュール                              |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴 | day1                                  |           |
| L-アスパラギナーゼ | 10000K.U./m <sup>2</sup>                  | 筋注     | day1                                  |           |

| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 16-35歳 A-2                   |        | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
|------------|---|--------|--|-----------|
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。 | 1コース   | 内服・その他内容                                   |           |
|            |   | 28日    | プレドニゾン：60mg/m <sup>2</sup> 分3 day1-20 以降漸減 |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する寛解導入療法A2 (16-35歳)               | 催吐リスク  |  |           |
|            |   | 中      |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技     | 投与スケジュール                                   |           |
| シクロホスファミド  | 1000mg/m <sup>2</sup>                     | 60分で点滴 | day1                                       |           |
| ダウノルビシン    | 50mg/m <sup>2</sup>                       | 30分で点滴 | day1-3                                     |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴 | day1,8,15,22                               |           |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴 | day9,11,13,16,18,20                        |           |

| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 16-35歳 C-1(C-2)              |           | 癌種                            | 急性リンパ性白血病 |
|------------|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。 | 1コース      | 内服・その他内容                      |           |
|            |   | 28日       | 【髄注】                          |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する地固めC-1(C-2) CNS予防 (16-35歳)      | 催吐リスク     | メトトレキサート：15mg/body 髄注 day1,15 |           |
|            |   | 中         | デキサメタゾン：3.3mg/body 髄注 day1,15 |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技        | 投与スケジュール                      |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴    | day1,15                       |           |
| メトトレキサート   | 300mg/m <sup>2</sup>                      | 30分で点滴    | day1,15                       |           |
| メトトレキサート   | 2700mg/m <sup>2</sup>                     | 23.5時間で点滴 | day1,15                       |           |
| L-アスパラギナーゼ | 10000K.U./m <sup>2</sup>                  | 4時間で点滴    | day2,16                       |           |

| レジメン名     | 【臨】 JSCT Ph+ 16-55歳 P-D                          |        | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
|-----------|--|--------|---|-----------|
| 解説        | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。        | 1コース   | 内服・その他内容                                    |           |
|           |  | 28日    | プレドニゾン：60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-7 以降漸減 |           |
| 備考        | Ph+ALLに対する地固めP-D ponatinib + DNR-COP 療法 (16-55歳) | 催吐リスク  | MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14            |           |
|           |  | 中      | 30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニブ          |           |
| 薬剤名       | 投与量  | 手技     | 投与スケジュール                                    |           |
| ダウノルビシン   | 50mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴 | day1  |           |
| シクロホスファミド | 1000mg/m <sup>2</sup>                            | 60分で点滴 | day1  |           |
| ビンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                             | 10分で点滴 | day1  |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body  | 髄注     | day1  |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body                                       | 髄注     | day1  |           |



|            |   |                       |  |           |
|------------|---|-----------------------|--|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JSCT Ph- 36-55歳 C-1(C-2)              |                       | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。 | 1コース                  | 【髄注】<br>内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日                   |  |           |
| 備考         | Ph-ALLに対する地固めC-1(C-2) CNS予防 (36-55歳)      | 催吐リスク                 | メトトレキサート：15mg/body 髄注 day1,15<br>デキサメタゾン：3.3mg/body 髄注 day1,15   |           |
|            |   | 中                     |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技                    | 投与スケジュール   |           |
| ビンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴                | day1,15  |           |
| メトトレキサート   | 200mg/m <sup>2</sup>                      | 30分で点滴                | day1,15  |           |
| メトトレキサート   | 1800mg/m <sup>2</sup>                     | 23.5時間で点滴             | day1,15  |           |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴                | day2,16  |           |
| レジメン名      | 【臨】 JALSG Ph+ALL219 地固め C1                |                       | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | Ph+急性リンパ性白血病の標準的治療の1つ。                    | 1コース                  | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 31日                   |  |           |
| 備考         | JALSG PH+ALL219 地固め C1 髄注のレジメンと併用する。      | 催吐リスク                 |  |           |
|            |   | 中                     |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技                    | 投与スケジュール   |           |
| メトトレキサート   | 100mg/m <sup>2</sup>                      | 1時間で点滴                | day1   |           |
| メトトレキサート   | 900mg/m <sup>2</sup>                      | 23時間で点滴               | day1   |           |
| シタラビン①     | 2000mg/m <sup>2</sup>                     | 3時間で点滴                | day2,3   |           |
| シタラビン②     | 2000mg/m <sup>2</sup>                     | 3時間で点滴<br>②は①と12時間空ける | day2,3   |           |
| レジメン名      | 【臨】 JALSG Ph+ALL213 寛解導入                  |                       | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | Ph+急性リンパ性白血病の標準的治療の1つ。                    | 1コース                  | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 42日                   |  |           |
| 備考         |   | 催吐リスク                 | プレドニゾロン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-21(22-28で漸減)<br>30mg/m <sup>2</sup> day22-23, 15mg/m <sup>2</sup> day24-25, 5mg/m <sup>2</sup> |           |
|            |   | 最小                    |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技                    | 投与スケジュール   |           |
| メトトレキサート   | 15mg/body                                 | 脳脊髄腔注射 (腰椎)           | day22  |           |
| デキサメタゾン    | 3.3mg/body                                | 脳脊髄腔注射 (腰椎)           | day22  |           |
| レジメン名      | HAM (ALL再寛解導入)                            |                       | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | 急性リンパ性白血病に対する汎用化学療法法の1つ。                  | 1コース                  | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日                   |  |           |
| 備考         |   | 催吐リスク                 |  |           |
|            |   | 中                     |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技                    | 投与スケジュール   |           |
| シタラビン①     | 2000mg/m <sup>2</sup>                     | 3時間で点滴                | day1-4   |           |
| ミトキサントロン   | 10mg/m <sup>2</sup>                       | 30分で点滴                | day2-5   |           |
| シタラビン②     | 2000mg/m <sup>2</sup>                     | 3時間で点滴<br>①と②は12時間空ける | day1-4   |           |
| レジメン名      | 【臨】 JALSG RR-ALL214 (CLEC)                |                       | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | 急性リンパ性白血病に対する治療                           | 1コース                  | 内服・その他内容   |           |
|            |   | 28日                   |  |           |
| 備考         |   | 催吐リスク                 |  |           |
|            |   | 中                     |  |           |
| 薬剤名        | 投与量                                       | 手技                    | 投与スケジュール   |           |
| クロファラビン    | 20-30mg/m <sup>2</sup>                    | 120分で点滴               | day1-5   |           |
| シクロホスファミド  | 200-440mg/m <sup>2</sup>                  | 60分で点滴                | day1-5   |           |
| エトポシド      | 50-100mg/m <sup>2</sup>                   | 90分で点滴                | day1-5   |           |

|  |   |  |  |           |
|--|---|--|--|-----------|
| レジメン名  | 【臨】 JALSG ALL202-U 1-5w 髄注  |  | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説   | 急性リンパ性白血病に対する寛解導入法  | 1コース                                   | 内服・その他内容   |           |
|  |   | 35日                                    |  |           |
| 備考   | 初診時中枢神経病変陽性の場合にday11,15を施行する。   | 催吐リスク                                  |  |           |
|  |   | 最小                                     |  |           |
| 薬剤名  | 投与量   | 手技                                     | 投与スケジュール   |           |
| メトトレキサート<br>シタラビン<br>ヒドロコルチゾン                          | 12mg/body<br>30mg/body<br>25mg/body   | 髄注                                     | day8,(11,15),22  |           |
| レジメン名  | 【臨】 JALSG Ph+ALL213 強化地固め   |  | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説   | Ph+急性リンパ性白血病に対する強化地固め療法。  | 1コース                                   | 内服・その他内容   |           |
|  |   | 38日                                    |  |           |
| 備考   |   | 催吐リスク                                  | ダサチニブ 100mg/day 経口分1 day4-31   |           |
|  |   | 中                                      |  |           |
| 薬剤名  | 投与量   | 手技                                     | 投与スケジュール   |           |
| シクロホスファミド<br>ダウノルビシン<br>ビンクリスチン<br>メトトレキサート<br>デキサメタゾン | 1200mg/m <sup>2</sup><br>45mg/m <sup>2</sup><br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>15mg/body<br>3.3mg/body | 3時間で点滴<br>1時間で点滴<br>10分で点滴<br>髄注<br>髄注 | day1<br>day1-3<br>day1,8,15,22<br>day1<br>day1   |           |
| レジメン名  | 【臨】 JALSG Ph+ALL213 地固めC1 (髄注)  |  | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説   | Ph+急性リンパ性白血病の標準的治療の1つ。  | 1コース                                   | 内服・その他内容   |           |
|  |   | 31日                                    |  |           |
| 備考   | JALSG Ph+ALL213地固めC1のレジメンと併用する。   | 催吐リスク                                  |  |           |
|  |   | 最小                                     |  |           |
| 薬剤名  | 投与量   | 手技                                     | 投与スケジュール   |           |
| メトトレキサート<br>デキサメタゾン                                    | 15mg/body<br>3.3mg/body   | 脳脊髄腔注射 (腰椎)<br>脳脊髄腔注射 (腰椎)             | day1<br>day1   |           |
| レジメン名  | 【臨】 JALSG Ph+ALL213 地固めC2   |  | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説   | Ph+急性リンパ性白血病に対する地固め療法。  | 1コース                                   | 内服・その他内容   |           |
|  |   | 29日                                    |  |           |
| 備考   |   | 催吐リスク                                  | プレドニゾロン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-7(8-14で漸減)<br>30mg/m <sup>2</sup> day8-9, 15mg/m <sup>2</sup> day10-11, 5mg/m <sup>2</sup> |           |
|  |   | 中                                      |  |           |
| 薬剤名  | 投与量   | 手技                                     | 投与スケジュール   |           |
| シクロホスファミド<br>ダウノルビシン<br>ビンクリスチン                        | 1200mg/m <sup>2</sup><br>45mg/m <sup>2</sup><br>1.3mg/m <sup>2</sup>                            | 3時間で点滴<br>1時間で点滴<br>10分で点滴             | day1<br>day1<br>day1   |           |
| レジメン名  | 【臨】 JALSG Ph+ALL213 維持  |  | 癌種   | 急性リンパ性白血病 |
| 解説   | Ph+急性リンパ性白血病に対する維持療法。   | 1コース                                   | 内服・その他内容   |           |
|  |   | 28日                                    |  |           |
| 備考   |   | 催吐リスク                                  | プレドニゾロン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-7(8-14で漸減)<br>30mg/m <sup>2</sup> day8-9, 15mg/m <sup>2</sup> day10-11, 5mg/m <sup>2</sup> |           |
|  |   | 最小                                     |  |           |
| 薬剤名  | 投与量   | 手技                                     | 投与スケジュール   |           |
| ビンクリスチン  | 1.3mg/m <sup>2</sup>  | 10分で点滴                                 | day1   |           |

| レジメン名          | <b>イノツズマブ オゾガマイシン</b>                  |        | 癌種                                 | 急性リンパ性白血病 |
|----------------|--|--------|------------------------------------|-----------|
| 解説             | CD22陽性の急性リンパ白血病に対する治療法。                | 1コース   | 内服・その他内容                           |           |
|                |  | 21-28日 |                                    |           |
| 備考             | 前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。 | 催吐リスク  |                                    |           |
|                |  | 中      |                                    |           |
| 薬剤名            | 投与量                                    | 手技     | 投与スケジュール                           |           |
| イノツズマブ オゾガマイシン | 0.8mg/m <sup>2</sup>                   | 1時間で点滴 | day1                               |           |
| イノツズマブ オゾガマイシン | 0.5mg/m <sup>2</sup>                   | 1時間で点滴 | day8,15,2c以降day1※<br>(※:寛解が得られた場合) |           |

| レジメン名   | <b>【臨】 JSCT Ph+ 16-65歳 P-M</b>            |        | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
|---------|---|--------|---|-----------|
| 解説      | JSCT特定臨床研究成人急性リンパ性白血病に対する治療<br>プロトコールの1つ。 | 1コース   | 内服・その他内容  |           |
|         |   | 28日    |   |           |
| 備考      | Ph+ALLに対する維持P-M (16-65歳)                  | 催吐リスク  | プレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-5 以降漸減<br>MRD陽性：ポナチニブ：45mg/body 分1 day1-14<br>30mg/body 分1 day15- ダサチニブ不耐容：ポナチニ |           |
|         |   | 最小     |   |           |
| 薬剤名     | 投与量                                       | 手技     | 投与スケジュール  |           |
| ビンクリスチン | 1.3mg/m <sup>2</sup>                      | 10分で点滴 | day1  |           |

| レジメン名     | <b>【臨】 JALSG Ph+ALL219 地固め C2</b>     |        | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
|-----------|---------------------------------------|--------|---|-----------|
| 解説        | Ph+急性リンパ性白血病に対する地固め療法。                | 1コース   | 内服・その他内容  |           |
|           |                                       | 29日    |   |           |
| 備考        | JALSG PH+ALL219 地固め C1C2髄注のレジメンと併用する。 | 催吐リスク  | プレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-14(15-21で<br>漸減) 30mg/m <sup>2</sup> day15-16 15mg/m <sup>2</sup> day17-18 5mg/m <sup>2</sup><br>day19-21 |           |
|           |                                       | 中      |   |           |
| 薬剤名       | 投与量                                   | 手技     | 投与スケジュール  |           |
| シクロホスファミド | 1200mg/m <sup>2</sup>                 | 3時間で点滴 | day1  |           |
| ダウノルビシン   | 45mg/m <sup>2</sup>                   | 1時間で点滴 | day1  |           |
| ビンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                  | 10分で点滴 | day1  |           |

| レジメン名    | <b>【臨】 JALSG Ph+ALL219 地固め C1C2 髄注</b> |       | 癌種       | 急性リンパ性白血病 |
|----------|--|-------|----------|-----------|
| 解説       | Ph+急性リンパ性白血病の標準的治療の髄注。                 | 1コース  | 内服・その他内容 |           |
|          |  | 31日   |          |           |
| 備考       | JALSG PH+ALL219 地固め C1またはC2のレジメンと併用する。 | 催吐リスク |          |           |
|          |  | 最小    |          |           |
| 薬剤名      | 投与量                                    | 手技    | 投与スケジュール |           |
| メトトレキサート | 15mg/body                              | 髄注    | day1     |           |
| デキサメタゾン  | 3.3mg/body                             | 髄注    | day1     |           |

| レジメン名     | <b>【臨】 JALSG Ph+ALL219 強化地固め</b> |        | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
|-----------|----------------------------------|--------|---|-----------|
| 解説        | Ph+急性リンパ性白血病に対する強化地固め療法。         | 1コース   | 内服・その他内容  |           |
|           |                                  | 38日    |   |           |
| 備考        |                                  | 催吐リスク  | プレドニゾロン：60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-14(15-21で<br>漸減) 30mg/m <sup>2</sup> day15-16 15mg/m <sup>2</sup> day17-18 5mg/m <sup>2</sup><br>day19-21 |           |
|           |                                  | 中      |   |           |
| 薬剤名       | 投与量                              | 手技     | 投与スケジュール  |           |
| シクロホスファミド | 1200mg/m <sup>2</sup>            | 3時間で点滴 | day1  |           |
| ダウノルビシン   | 45mg/m <sup>2</sup>              | 1時間で点滴 | day1-3  |           |
| ビンクリスチン   | 1.3mg/m <sup>2</sup>             | 10分で点滴 | day1,8,15,22  |           |
| メトトレキサート  | 15mg/body                        | 髄注     | day1  |           |
| デキサメタゾン   | 3.3mg/body                       | 髄注     | day1  |           |



|          |                          |       |   |           |
|----------|--------------------------|-------|---|-----------|
| レジメン名    | 【臨】 JALSG Ph+ALL219 寛解導入 |       | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説       | Ph+急性リンパ性白血病に対する寛解導入療法。  | 1コース  | 内服・その他内容  |           |
|          |                          | 42日   | プレドニゾン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 先行投与7日            |           |
| 備考       |                          | 催吐リスク | プレドニゾン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-21(22-28で漸減) |           |
|          |                          | 最小    |   |           |
| 薬剤名      | 投与量                      | 手技    | 投与スケジュール  |           |
| メトトレキサート | 15mg/body                | 髄注    | day15   |           |
| デキサメタゾン  | 3.3mg/body               | 髄注    | day15   |           |

|            |                                   |        |   |           |
|------------|-----------------------------------|--------|---|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入      |        | 癌種                                      | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | Ph-急性リンパ性白血病に対する寛解導入療法。           | 1コース   | 内服・その他内容                                |           |
|            |                                   | 29日    | プレドニゾン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-28 |           |
| 備考         | JALSG Ph(-)B-ALL213 髄注のレジメンと併用する。 | 催吐リスク  | day29以降漸減し7日間で中止                        |           |
|            |                                   | 中      | ※45-60歳でday22以降、60-65歳でday15以降漸減        |           |
| 薬剤名        | 投与量                               | 手技     | 投与スケジュール                                |           |
| シクロホスファミド  | 1200mg/m <sup>2</sup>             | 3時間で点滴 | day8                                    |           |
| ダウノルビシン    | 45mg/m <sup>2</sup>               | 1時間で点滴 | day8-10                                 |           |
| ピンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>              | 10分で点滴 | day8,15,22,29                           |           |
| L-アスパラギナーゼ | 5000K.U./m <sup>2</sup>           | 4時間で点滴 | day15から隔日で29まで                          |           |

|         |   |           |          |           |
|---------|---|-----------|----------|-----------|
| レジメン名   | ブリナツモマブ   |           | 癌種       | 急性リンパ性白血病 |
| 解説      | 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病に対する治療法。                                    | 1コース      | 内服・その他内容 |           |
|         |   | 42 (84) 日 |          |           |
| 備考      | 導入療法：42日最大5サイクル 維持療法：84日最大4サイクル                                   | 催吐リスク     |          |           |
|         |   | 最小        |          |           |
| 薬剤名     | 投与量   | 手技        | 投与スケジュール |           |
| ブリナツモマブ | 9μg/m <sup>2</sup> (5μg/m <sup>2</sup> )                          | 24時間で点滴   | day1-7   |           |
| ブリナツモマブ | 28μg/m <sup>2</sup> (15μg/m <sup>2</sup> )<br>体重48kg未満の場合 ()<br>内 | 24時間で点滴   | day8-28  |           |

|            |  |         |   |           |
|------------|--|---------|---|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C2C5           |         | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | Ph-急性リンパ性白血病に対する地固め療法。                     | 1コース    | 内服・その他内容                                  |           |
|            |  | 21日     | メルカプトプリン 25mg/m <sup>2</sup> 経口分1 day1-21 |           |
| 備考         | JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C2C5 髄注のレジメンと併用する。 | 催吐リスク   |   |           |
|            |  | 中       |   |           |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技      | 投与スケジュール                                  |           |
| ピンクリスチン    | 1.3mg/m <sup>2</sup>                       | 10分で点滴  | day1,15                                   |           |
| メトトレキサート   | 3000mg/m <sup>2</sup>                      | 24時間で点滴 | day1,15                                   |           |
| L-アスパラギナーゼ | 10000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴  | day3,17                                   |           |

|            |  |                       |          |           |
|------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| レジメン名      | 【臨】 JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C1C4           |                       | 癌種       | 急性リンパ性白血病 |
| 解説         | Ph-急性リンパ性白血病に対する地固め療法。                     | 1コース                  | 内服・その他内容 |           |
|            |  | 4日                    |          |           |
| 備考         | JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C1C4 髄注のレジメンと併用する。 | 催吐リスク                 |          |           |
|            |  | 最小                    |          |           |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技                    | 投与スケジュール |           |
| シタラビン①     | 2000mg/m <sup>2</sup>                      | 3時間で点滴                | day1-3   |           |
| エトポシド      | 100mg/m <sup>2</sup>                       | 1時間で点滴                | day1-3   |           |
| シタラビン②     | 2000mg/m <sup>2</sup>                      | 3時間で点滴                | day1-3   |           |
| L-アスパラギナーゼ | 10000K.U./m <sup>2</sup>                   | 4時間で点滴<br>②は①と12時間空ける | day4     |           |

| レジメン名             | 【臨】 JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C2C5 髄注     |          | 癌種                 | 急性リンパ性白血病 |
|-------------------|---|----------|--------------------|-----------|
| 解説                | Ph-急性リンパ性白血病に対する地固め療法(髄注)。              | 1コース     | 内服・その他内容           |           |
|                   |   | 21日      |                    |           |
| 備考                | JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C2C5のレジメンと併用する。 | 催吐リスク    |                    |           |
|                   |   | 最小       |                    |           |
| 薬剤名               | 投与量                                     | 手技       | 投与スケジュール           |           |
| メトトレキサート<br>シタラビン | 15mg/body<br>40mg/body                  | 髄注<br>髄注 | day1,15<br>day1,15 |           |

| レジメン名             | 【臨】 JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C1C4 髄注     |          | 癌種           | 急性リンパ性白血病 |
|-------------------|---|----------|--------------|-----------|
| 解説                | Ph-急性リンパ性白血病に対する地固め療法(髄注)。              | 1コース     | 内服・その他内容     |           |
|                   |   | 4日       |              |           |
| 備考                | JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C1C4のレジメンと併用する。 | 催吐リスク    |              |           |
|                   |   | 中        |              |           |
| 薬剤名               | 投与量                                     | 手技       | 投与スケジュール     |           |
| メトトレキサート<br>シタラビン | 15mg/body<br>40mg/body                  | 髄注<br>髄注 | day1<br>day1 |           |

| レジメン名             | 【臨】 JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入 髄注     |          | 癌種                 | 急性リンパ性白血病 |
|-------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
| 解説                | Ph-急性リンパ性白血病に対する寛解導入療法。             | 1コース     | 内服・その他内容           |           |
|                   |                                     | 29日      |                    |           |
| 備考                | JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入のレジメンと併用する。 | 催吐リスク    |                    |           |
|                   |                                     | 最小       |                    |           |
| 薬剤名               | 投与量                                 | 手技       | 投与スケジュール           |           |
| メトトレキサート<br>シタラビン | 15mg/body<br>40mg/body              | 髄注<br>髄注 | day8,15<br>day8,15 |           |

| レジメン名  | 【臨】 JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C3   |  | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
|--|--|--|---|-----------|
| 解説   | Ph-急性リンパ性白血病に対する地固め療法。   | 1コース   | 内服・その他内容  |           |
|  |  | 42日  |   |           |
| 備考   | JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C3 髄注のレジメンと併用する。   | 催吐リスク  | デキサメタゾン 10mg/m <sup>2</sup> 経口分1 day1-8,15-22<br>メルカプトプリン 60mg/m <sup>2</sup> 経口分1 day29-42 |           |
|  |  | 中  |   |           |
| 薬剤名  | 投与量  | 手技   | 投与スケジュール  |           |
| ダウノルビシン<br>ビンクリスチン<br>L-アスパラギナーゼ<br>シクロホスファミド<br>シタラビン | 45mg/m <sup>2</sup><br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>5000K.U./m <sup>2</sup><br>1200mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup> | 1時間で点滴<br>10分で点滴<br>4時間で点滴<br>3時間で点滴<br>1時間で点滴 | day1,8,15<br>day1,8,15<br>day2,4,6,9,11,13<br>day29<br>day29-33,36-40                       |           |

| レジメン名             | 【臨】 JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C3 髄注     |          | 癌種                 | 急性リンパ性白血病 |
|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
| 解説                | Ph-急性リンパ性白血病に対する地固め療法(髄注)。            | 1コース     | 内服・その他内容           |           |
|                   |                                       | 42日      |                    |           |
| 備考                | JALSG PH(-)B-ALL213 地固め C3のレジメンと併用する。 | 催吐リスク    |                    |           |
|                   |                                       | 最小       |                    |           |
| 薬剤名               | 投与量                                   | 手技       | 投与スケジュール           |           |
| メトトレキサート<br>シタラビン | 15mg/body<br>40mg/body                | 髄注<br>髄注 | day1,29<br>day1,29 |           |

|               |  |             |   |           |
|---------------|--|-------------|---|-----------|
| レジメン名         | <b>【臨】 JALSG Ph+ALL219 維持</b>  |             | 癌種  | 急性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考      | Ph+急性リンパ性白血病に対する維持療法。  | 1コース        | 内服・その他内容<br>プレドニゾン：60mg/m <sup>2</sup> 経口分3 day1-7(8-14で漸減) 30mg/m <sup>2</sup> day8-9 15mg/m <sup>2</sup> day10-11 5mg/m <sup>2</sup> day12-14 |           |
|               |  | 28日         |   |           |
|               |  | 催吐リスク<br>最小 |   |           |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技          | 投与スケジュール  |           |
| ビンクリスチン       | 1.3mg/m <sup>2</sup>   | 10分で点滴      | day1  |           |
| レジメン名         | <b>R+ベネトクラクス</b>   |             | 癌種  | 慢性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考      | 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病の治療として適応が認められたため<br>リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。    | 1コース        | 内服・その他内容<br>ベネトクラクス 漸増期：20mg/b【1週目】，50mg/b【2週目】，100mg/b【3週目】，200mg/b【4週目】，400mg/b【5週目】 維持期：400mg/b【6週目-】 経口                                     |           |
|               |  | 最大6サイ       |   |           |
|               |  | 催吐リスク<br>最小 |   |           |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技          | 投与スケジュール  |           |
| リツキシマブ(初回)    | 375mg/m <sup>2</sup>   | 2-3時間で点滴    | day1(初回)  |           |
| リツキシマブ(2回目以降) | 500mg/m <sup>2</sup>   | 2-3時間で点滴    | day1(2回目以降)   |           |
| レジメン名         | <b>オファツムマブ (CD20陽性CLL)</b>   |             | 癌種  | 慢性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考      | 再発または難治性のCD20陽性慢性リンパ性白血病に用いる。<br>1-8回まで1週間隔、4-5週休薬後、12回まで4週間隔。                           | 1コース        | 内服・その他内容<br>アセトアミノフェン 400mg 投与30分-2時間前<br>レボセチリジン塩酸塩 5mg 投与30分-2時間前   |           |
|               |  | 催吐リスク       |   |           |
|               |  | 最小          |   |           |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技          | 投与スケジュール  |           |
| オファツムマブ       | 300mg/body<br>2000mg/body  | 4時間以上かけて点滴  |   |           |
| レジメン名         | <b>フルダラビン</b>  |             | 癌種  | 慢性リンパ性白血病 |
| 解説<br>備考      | 慢性リンパ性白血病の標準治療。  | 1コース        | 内服・その他内容  |           |
|               |  | 28日         |   |           |
|               |  | 催吐リスク<br>最小 |   |           |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技          | 投与スケジュール  |           |
| フルダラビン        | 25mg/m <sup>2</sup>  | 30分で点滴      | day1-5  |           |
| レジメン名         | <b>モガムリズマブ (CCR4陽性のATL,PTCL,CTCL)</b>  |             | 癌種  | T細胞リンパ腫   |
| 解説<br>備考      | CCR4陽性のATL・PTCL・CTCLに対する新規治療法。<br>8コース連続。他の抗がん剤と併用する場合は14日毎。前投薬(アセトアミノフェン・クロルフェニラミン)を行う。 | 1コース        | 内服・その他内容  |           |
|               |  | 7日          |   |           |
|               |  | 催吐リスク<br>最小 |   |           |
| 薬剤名           | 投与量  | 手技          | 投与スケジュール  |           |
| モガムリズマブ       | 1mg/kg   | 120分で点滴     | day1  |           |

|           |                             |                       |         |   |                     |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------|---|---------------------|
| レジメン名     |                             | <b>モガリズマブ (CTCL)</b>  |         | 癌種  | T細胞リンパ腫             |
| 解説        | CCR4陽性の皮膚T細胞リンパ腫に対する新規治療法。  |                       | 1コース    | 内服・その他内容                                  |                     |
|           |                             |                       | 14日     |   |                     |
| 備考        | 1週間間隔で5回投与後、2週間隔            |                       | 催吐リスク   |   |                     |
|           |                             |                       | 最小      |   |                     |
| 薬剤名       |                             | 投与量                   | 手技      | 投与スケジュール                                  |                     |
| モガリズマブ    |                             | 1mg/kg                | 2時間で点滴  | day1,8,15,22,29,43...                     |                     |
| レジメン名     |                             | <b>LSG15 【B】</b>      |         | 癌種  | 成人T細胞白血病・リンパ腫       |
| 解説        | 成人T細胞性白血病/リンパ腫の標準治療。        |                       | 1コース    | 内服・その他内容                                  |                     |
|           |                             |                       | 28日     | プレドニゾロン 40mg/m <sup>2</sup> 経口分1 day8     |                     |
| 備考        | 【A】を第1週、【B】を第2週、【C】を第3週に行う。 |                       | 催吐リスク   |   |                     |
|           |                             |                       | 中       |   |                     |
| 薬剤名       |                             | 投与量                   | 手技      | 投与スケジュール                                  |                     |
| ドキシソルビシン  |                             | 30mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴  | day8                                      |                     |
| ラニムスチン    |                             | 60mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴  | day8                                      |                     |
| レジメン名     |                             | <b>LSG15 【C】</b>      |         | 癌種  | 成人T細胞白血病・リンパ腫       |
| 解説        | 成人T細胞性白血病/リンパ腫の標準治療。        |                       | 1コース    | 内服・その他内容                                  |                     |
|           |                             |                       | 28日     | プレドニゾロン 40mg/m <sup>2</sup> 経口分1 day15-17 |                     |
| 備考        | 【A】を第1週、【B】を第2週、【C】を第3週に行う。 |                       | 催吐リスク   |   |                     |
|           |                             |                       | 中       |   |                     |
| 薬剤名       |                             | 投与量                   | 手技      | 投与スケジュール                                  |                     |
| ビンデシン     |                             | 2.4mg/m <sup>2</sup>  | 10分で点滴  | day15                                     |                     |
| エトポシド     |                             | 100mg/m <sup>2</sup>  | 60分で点滴  | day15-17                                  |                     |
| カルボプラチン   |                             | 250mg/m <sup>2</sup>  | 120分で点滴 | day15                                     |                     |
| レジメン名     |                             | <b>LSG15 【A】</b>      |         | 癌種  | 成人T細胞白血病・リンパ腫       |
| 解説        | 成人T細胞性白血病/リンパ腫の標準治療。        |                       | 1コース    | 内服・その他内容                                  |                     |
|           |                             |                       | 28日     |   |                     |
| 備考        | 【A】を第1週、【B】を第2週、【C】を第3週に行う。 |                       | 催吐リスク   |   |                     |
|           |                             |                       | 中       |   |                     |
| 薬剤名       |                             | 投与量                   | 手技      | 投与スケジュール                                  |                     |
| ドキシソルビシン  |                             | 40mg/m <sup>2</sup>   | 30分で点滴  | day1                                      |                     |
| シクロホスファミド |                             | 350mg/m <sup>2</sup>  | 120分で点滴 | day1                                      |                     |
| ビンクリスチン   |                             | 1mg/m <sup>2</sup>    | 10分で点滴  | day1                                      |                     |
| レジメン名     |                             | <b>ネララビン</b>          |         | 癌種  | T細胞急性リンパ性白血病、T細胞リンパ |
| 解説        | T細胞リンパ芽球性リンパ腫、T細胞急性リンパ性白血病  |                       | 1コース    | 内服・その他内容                                  |                     |
|           | に対する治療法。                    |                       | 21日     |   |                     |
| 備考        |                             |                       | 催吐リスク   |   |                     |
|           |                             |                       | 最小      |   |                     |
| 薬剤名       |                             | 投与量                   | 手技      | 投与スケジュール                                  |                     |
| ネララビン     |                             | 1500mg/m <sup>2</sup> | 2時間で点滴  | day1,3,5                                  |                     |

|            |  |                                |                        |            |
|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------|
| レジメン名      | <b>SMILE</b>                                     |                                | 癌種                     | NK/T細胞リンパ腫 |
| 解説<br>備考   | NK/T細胞リンパ腫に対し有効性のある治療法                           | 1コース                           | 内服・その他内容               |            |
|            |  | 28日                            |                        |            |
|            | 催吐リスク  | 中                              |                        |            |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技                             | 投与スケジュール               |            |
| メトトレキサート   | 2000mg/m <sup>2</sup>                            | 6時間で点滴                         | day1                   |            |
| イホスファミド    | 1500mg/m <sup>2</sup>                            | 2時間で点滴                         | day2-4                 |            |
| エトポシド      | 100mg/m <sup>2</sup>                             | 2時間で点滴                         | day2-4                 |            |
| L-アスパラギナーゼ | 6000K.U./m <sup>2</sup>                          | 4時間で点滴                         | day8,10,12,14,16,18,20 |            |
| レジメン名      | <b>BuTT (Bu 1日1回) (移植前処置)</b>                    |                                | 癌種                     | 移植前処置      |
| 解説<br>備考   | 自家造血幹細胞移植に対する適応が認められているため                        | 1コース                           | 内服・その他内容               |            |
|            |  | 6日                             |                        |            |
|            | フェニトイン 300m/body 経口分3 : ブスルファン投与3日前から終了2日後まで     | 催吐リスク                          |                        |            |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技                             | 投与スケジュール               |            |
| ブスルファン     | 3.2m/kg  | 3時間で点滴                         | day1-4                 |            |
| チオテパ       | 5m/kg  | 2時間で点滴                         | day5-6                 |            |
| レジメン名      | <b>CPA大量</b>                                     |                                | 癌種                     | 移植前処置      |
| 解説<br>備考   | 末梢血幹細胞採取前の標準的化学療法の一つ。                            | 1コース                           | 内服・その他内容               |            |
|            |  | 高                              |                        |            |
|            | 高  | 催吐リスク                          |                        |            |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技                             | 投与スケジュール               |            |
| シクロホスファミド  | 2000mg/m <sup>2</sup>                            | 2時間で点滴                         | day1,2                 |            |
| レジメン名      | <b>Flu-Bu4</b>                                   |                                | 癌種                     | 移植前処置      |
| 解説<br>備考   | 造血幹細胞移植に対する汎用移植前処置。                              | 1コース                           | 内服・その他内容               |            |
|            |  | 5日                             |                        |            |
|            | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与2日前から2日後までフェニトイン100mg3錠分3で投与。 | 催吐リスク                          |                        |            |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技                             | 投与スケジュール               |            |
| フルダラビン     | 30mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                         | day1-5                 |            |
| ブスルファン     | 0.8mg/kg   | 120分で点滴                        | day1-4                 |            |
| ブスルファン     | 0.8mg/kg   | 120分で点滴                        | day1-4                 |            |
| ブスルファン     | 0.8mg/kg   | 120分で点滴                        | day2-5                 |            |
| ブスルファン     | 0.8mg/kg   | 120分で点滴                        | day2-5                 |            |
| レジメン名      | <b>Flu-Mel-TBI</b>                               |                                | 癌種                     | 移植前処置      |
| 解説<br>備考   | 造血幹細胞移植の移植前処置。                                   | 1コース                           | 内服・その他内容               |            |
|            |  | TBI 2G/日 (total 4G) 移植day-2,-1 |                        |            |
|            | day9に移植を行う。                                      | 催吐リスク                          |                        |            |
| 薬剤名        | 投与量  | 手技                             | 投与スケジュール               |            |
| フルダラビン     | 25mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                         | day1-5                 |            |
| アルケラン      | 80mg/m <sup>2</sup>                              | 60分で点滴                         | day6                   |            |

| レジメン名             | Bu-CY (Bu1日1回)              |         | 癌種                        | 移植前処置 |
|-------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 解説                | 造血幹細胞移植に対する移植前処置。ブスルフェクス1   | 1コース    | 内服・その他内容                  |       |
| 備考                | 日1回投与法。                     |         |                           |       |
| 備考                | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与3日前から2日後 | 催吐リスク   |                           |       |
| 備考                | までフェニトイン100mg3錠分3で投与。       | 高       |                           |       |
| 薬剤名               | 投与量                         | 手技      | 投与スケジュール                  |       |
| ブスルファン            | 3.2mg/kg                    | 3時間で点滴  | day1-4                    |       |
| シクロホスファミド         | 60mg/kg                     | 2時間で点滴  | day6-7                    |       |
| レジメン名             | Flu-Bu4-Mel (移植前処置)         |         | 癌種                        | 移植前処置 |
| 解説                | 造血幹細胞移植に対する汎用移植前処置。         | 1コース    | 内服・その他内容                  |       |
| 備考                |                             | 6日      |                           |       |
| 備考                | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与2日前から2日後 | 催吐リスク   |                           |       |
| 備考                | までフェニトイン100mg3錠分3で投与。       | 中       |                           |       |
| 薬剤名               | 投与量                         | 手技      | 投与スケジュール                  |       |
| フルダラビン            | 30mg/m <sup>2</sup>         | 30分で点滴  | day1-6                    |       |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg                    | 2時間で点滴  | day1 15,21時               |       |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg                    | 2時間で点滴  | day2-4 3,9,15,21時         |       |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg                    | 2時間で点滴  | day5 3,9時                 |       |
| メルファラン            | 40mg/m <sup>2</sup>         | 1時間で点滴  | day5,6                    |       |
| レジメン名             | CY-Flu                      |         | 癌種                        | 移植前処置 |
| 解説                | 造血幹細胞移植に対するミニ移植前処置。         | 1コース    | 内服・その他内容                  |       |
| 備考                |                             |         |                           |       |
| 備考                |                             | 催吐リスク   |                           |       |
| 備考                |                             | 高       |                           |       |
| 薬剤名               | 投与量                         | 手技      | 投与スケジュール                  |       |
| シクロホスファミド         | 60mg/kg                     | 2時間で点滴  | day1-2                    |       |
| フルダラビン            | 25mg/m <sup>2</sup>         | 30分で点滴  | day3-7                    |       |
| レジメン名             | short-term MTX (移植後GVHD予防)  |         | 癌種                        | 移植前処置 |
| 解説                | 造血幹細胞移植時のGVHD予防の1つ。         | 1コース    | 内服・その他内容                  |       |
| 備考                |                             | 6日      |                           |       |
| 備考                |                             | 催吐リスク   |                           |       |
| 備考                |                             | 最小      |                           |       |
| 薬剤名               | 投与量                         | 手技      | 投与スケジュール                  |       |
| メトトレキサート          | 15mg/m <sup>2</sup>         | 静注      | day1                      |       |
| メトトレキサート          | 10mg/m <sup>2</sup>         | 静注      | day3,6                    |       |
| レジメン名             | TBI+Flu-CY-ATG (移植前処置)      |         | 癌種                        | 移植前処置 |
| 解説                | 造血幹細胞移植に対する移植前処置。           | 1コース    | 内服・その他内容                  |       |
| 備考                |                             |         | TBI 2Gy day6              |       |
| 備考                |                             | 催吐リスク   | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリンは本投与前に試験 |       |
| 備考                |                             | 中       | 投与を行う。                    |       |
| 薬剤名               | 投与量                         | 手技      | 投与スケジュール                  |       |
| フルダラビン            | 30mg/m <sup>2</sup>         | 30分で点滴  | day1-4                    |       |
| シクロホスファミド         | 25mg/kg                     | 2時間で点滴  | day1-4                    |       |
| 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン | 1.25mg/kg                   | 12時間で点滴 | day3-4                    |       |

| レジメン名             | induction chemotherapy1 high-dose MTX (BUCYE)   |         | 癌種  | 移植前処置 |
|-------------------|---|---------|---|-------|
| 解説                | 悪性リンパ腫自家移植前処置の一つ。                               | 1コース    | 内服・その他内容<br>※メトトレキサートは7g/bodyを上限とする。        |       |
|                   |   | 14日     |   |       |
| 備考                | 5コース繰り返す。                                       | 催吐リスク   |   |       |
|                   |   | 中       |   |       |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技      | 投与スケジュール                                    |       |
| メトトレキサート          | 3500mg/m <sup>2</sup> ※                         | 120分で点滴 | day1  |       |
| レジメン名             | Flu-Bu2±TBI(Bu1日1回)                             |         | 癌種  | 移植前処置 |
| 解説                | 造血幹細胞移植のミニ移植における汎用移植前処置。                        | 1コース    | 内服・その他内容<br>TBI 2-4Gy 移植day-1               |       |
|                   |   | 6日      |   |       |
| 備考                | day9に骨髄移植を行う。                                   | 催吐リスク   |   |       |
|                   |   | 中       |   |       |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技      | 投与スケジュール                                    |       |
| フルダラビン            | 30mg/m <sup>2</sup>                             | 30分で点滴  | day1-6                                      |       |
| ブスルファン            | 3.2mg/kg  | 3時間で点滴  | day3,4                                      |       |
| レジメン名             | Flu-Bu2-ATG (Bu1日1回)                            |         | 癌種  | 移植前処置 |
| 解説                | ミニ移植において汎用されている移植前処置。                           | 1コース    | 内服・その他内容<br>抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリンは本投与前に試験投与を行う。 |       |
|                   |   |         |   |       |
| 備考                | day9に骨髄移植を行う。                                   | 催吐リスク   |   |       |
|                   |   | 中       |   |       |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技      | 投与スケジュール                                    |       |
| ブスルファン            | 3.2mg/kg  | 3時間で点滴  | day3-4                                      |       |
| フルダラビン            | 30mg/m <sup>2</sup>                             | 30分で点滴  | day1-6                                      |       |
| 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン | 5mg/kg  | 12時間で点滴 | day7  |       |
| メトトレキサート          | 10mg/m <sup>2</sup>                             | 静注      | day10                                       |       |
| メトトレキサート          | 7mg/m <sup>2</sup>                              | 静注      | day12,15                                    |       |
| レジメン名             | short-term MTX                                  |         | 癌種  | 移植前処置 |
| 解説                | 造血幹細胞移植時のGVHD予防の1つ。                             | 1コース    | 内服・その他内容                                    |       |
|                   |   | 6日      |   |       |
| 備考                |   | 催吐リスク   |   |       |
|                   |   | 最小      |   |       |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技      | 投与スケジュール                                    |       |
| メトトレキサート          | 15mg/m <sup>2</sup>                             | 静注      | day1  |       |
| メトトレキサート          | 10mg/m <sup>2</sup>                             | 静注      | day3,6,11                                   |       |
| レジメン名             | induction chemotherapy2 high-dose Ara-C (BUCYE) |         | 癌種  | 移植前処置 |
| 解説                | 悪性リンパ腫自家移植前処置の一つ。                               | 1コース    | 内服・その他内容                                    |       |
|                   |   | 28日     |   |       |
| 備考                | induction chemotherapy1の5コース目終了後実施。2コース繰り返す。    | 催吐リスク   |   |       |
|                   |   | 中       |   |       |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技      | 投与スケジュール                                    |       |
| シタラビン             | 3000mg/m <sup>2</sup>                           | 120分で点滴 | day1  |       |



| レジメン名             |  | CY-Bu (Bu1日1回)            |   | 癌種 | 移植前処置 |
|-------------------|--|---------------------------|---|----|-------|
| 解説                | 造血幹細胞移植に対する移植前処置。ブスルフェクス1                        | 1コース                      | 内服・その他内容  |    |       |
|                   | 日1回投与法。  |                           |   |    |       |
| 備考                | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与3日前から2日後までフェニトイン100mg3錠分3で投与。 | 催吐リスク                     |   |    |       |
|                   |  | 高                         |   |    |       |
| 薬剤名               | 投与量  | 手技                        | 投与スケジュール  |    |       |
| シクロホスファミド         | 60mg/kg  | 2時間で点滴                    | day1-2  |    |       |
| ブスルファン            | 3.2mg/kg   | 3時間で点滴                    | day4-7  |    |       |
| レジメン名             |  | Flu-Mel-ATG               |   | 癌種 | 移植前処置 |
| 解説                | 臍帯血移植前処置。  | 1コース                      | 内服・その他内容  |    |       |
|                   |  | 6日                        |   |    |       |
| 備考                | day7を移植日とする。                                     | 催吐リスク                     |   |    |       |
|                   |  | 中                         |   |    |       |
| 薬剤名               | 投与量  | 手技                        | 投与スケジュール  |    |       |
| フルダラビン            | 25mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                    | day1-4  |    |       |
| メルファラン            | 70mg/m <sup>2</sup>                              | 60分で点滴                    | day4,5  |    |       |
| レジメン名             |  | BUCYE (BU : 1日4回) (移植前処置) |   | 癌種 | 移植前処置 |
| 解説                | 造血幹細胞移植に対する移植前処置。                                | 1コース                      | 内服・その他内容  |    |       |
|                   |  |                           |   |    |       |
| 備考                |  | 催吐リスク                     |   |    |       |
|                   |  | 高                         |   |    |       |
| 薬剤名               | 投与量  | 手技                        | 投与スケジュール  |    |       |
| ブスルファン 1日4回       | 0.8mg/kg × 4回                                    | 2時間で点滴 × 4回               | day1-4  |    |       |
| エトポシド             | 100mg/kg   | 2時間で点滴 (12時間毎)            | day3,4,5 (1回-2回-1回)   |    |       |
| シクロホスファミド         | 600mg/kg   | 2時間で点滴                    | day5,6  |    |       |
| レジメン名             |  | VP-16大量                   |   | 癌種 | 移植前処置 |
| 解説                | 末梢血幹細胞採取前の標準的化学療法の1つ。                            | 1コース                      | 内服・その他内容  |    |       |
|                   |  |                           |   |    |       |
| 備考                |  | 催吐リスク                     |   |    |       |
|                   |  | 軽                         |   |    |       |
| 薬剤名               | 投与量  | 手技                        | 投与スケジュール  |    |       |
| エトポシド             | 500mg/m <sup>2</sup>                             | 3時間で点滴                    | day1-3  |    |       |
| レジメン名             |  | Flu-Bu2-ATG               |   | 癌種 | 移植前処置 |
| 解説                | ミニ移植において汎用されている移植前処置。                            | 1コース                      | 内服・その他内容  |    |       |
|                   |  |                           |   |    |       |
| 備考                | day9に骨髄移植を行う。                                    | 催吐リスク                     | ブスルファンはday3は3回、day4は4回、day5は1回<br>抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリンは本投与前に試験投与を行う。 |    |       |
|                   |  | 中                         |   |    |       |
| 薬剤名               | 投与量  | 手技                        | 投与スケジュール  |    |       |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg   | 2時間で点滴                    | day3-5  |    |       |
| フルダラビン            | 30mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴                    | day1-6  |    |       |
| 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン | 5mg/kg   | 12時間                      | day7  |    |       |
| メトトレキサート          | 10mg/m <sup>2</sup>                              | 静注                        | day10   |    |       |
| メトトレキサート          | 7mg/m <sup>2</sup>                               | 静注                        | day12,15  |    |       |



| レジメン名                 |  | Flu-Bu4-Mel (Bu1日1回) | 癌種                                      | 移植前処置 |
|-----------------------|--|----------------------|---|-------|
| 解説                    | 造血幹細胞移植に対する汎用移植前処置。                              | 1コース                 | 内服・その他内容                                |       |
|                       |  | 6日                   |   |       |
| 備考                    | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与2日前から2日後までフェニトイン100mg3錠分3で投与。 | 催吐リスク<br>中           |   |       |
| 薬剤名                   | 投与量  | 手技                   | 投与スケジュール                                |       |
| ブスルファン                | 3.2mg/kg   | 3時間で点滴               | day1-4                                  |       |
| フルダラビン                | 30mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴               | day1-6                                  |       |
| メルファラン                | 40mg/m <sup>2</sup>                              | 1時間で点滴               | day5,6                                  |       |
| レジメン名                 |  | CY-TBI               | 癌種                                      | 移植前処置 |
| 解説                    | 急性白血病に対する造血幹細胞移植の前処置の1つ。                         | 1コース                 | 内服・その他内容<br>TBI 1回2Gy1日2回 移植day-3-day-1 |       |
|                       |  |                      |   |       |
| 備考                    | 移植はday7に行う。                                      | 催吐リスク<br>高           |   |       |
| 薬剤名                   | 投与量  | 手技                   | 投与スケジュール                                |       |
| シクロホスファミド             | 30mg/kg  | 2時間で点滴               | day1,2                                  |       |
| レジメン名                 |  | M-BEAM               | 癌種                                      | 移植前処置 |
| 解説                    | ハイリスクの悪性リンパ腫における自家移植の前処置。                        | 1コース                 | 内服・その他内容                                |       |
|                       |  |                      |   |       |
| 備考                    | day7に移植を行う。                                      | 催吐リスク<br>軽           |   |       |
| 薬剤名                   | 投与量  | 手技                   | 投与スケジュール                                |       |
| ラムスチン                 | 300mg/m <sup>2</sup>                             | 60分で点滴               | day1                                    |       |
| エトポシド①② (12時間間隔で1日2回) | 100mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup>     | ①60分、②180分で点滴        | day2-5                                  |       |
| シタラビン①② (12時間間隔で1日2回) | 140mg/m <sup>2</sup>                             | 60分で点滴<br>30分で点滴     | day2-5<br>day6                          |       |
| レジメン名                 |  | CY-Ara-C-TBI         | 癌種                                      | 移植前処置 |
| 解説                    | 造血幹細胞移植に対する汎用移植前処置。                              | 1コース                 | 内服・その他内容<br>TBI total12Gy 移植day-9-day-6 |       |
|                       |  | 4日                   |   |       |
| 備考                    |  | 催吐リスク<br>中           |   |       |
| 薬剤名                   | 投与量  | 手技                   | 投与スケジュール                                |       |
| シタラビン                 | 3000mg/m <sup>2</sup>                            | 120分で点滴              | day1-2                                  |       |
| シタラビン                 | 3000mg/m <sup>2</sup>                            | 120分で点滴<br>12時間空ける   | day1-2                                  |       |
| レジメン名                 |  | Flu-Bu2±TBI          | 癌種                                      | 移植前処置 |
| 解説                    | 造血幹細胞移植のミニ移植における汎用移植前処置。                         | 1コース                 | 内服・その他内容<br>TBI 2-4Gy 移植day-1           |       |
|                       |  | 6日                   |   |       |
| 備考                    | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与2日前から2日後までフェニトイン100mg3錠分3で投与。 | 催吐リスク<br>中           |   |       |
| 薬剤名                   | 投与量  | 手技                   | 投与スケジュール                                |       |
| フルダラビン                | 30mg/m <sup>2</sup>                              | 30分で点滴               | day1-6                                  |       |
| ブスルファン                | 0.8mg/kg   | 120分で点滴              | day3-4                                  |       |
| ブスルファン                | 0.8mg/kg   | 120分で点滴              | day3-4                                  |       |
| ブスルファン                | 0.8mg/kg   | 120分で点滴              | day3-4                                  |       |
| ブスルファン                | 0.8mg/kg   | 120分で点滴              | day4-5                                  |       |

| レジメン名             |   | BUCYE (Bu1日1回)  |  | 癌種                                   | 移植前処置  |
|-------------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|--------|
| 解説<br>備考          | 造血幹細胞移植に対する移植前処置。                                   | 1コース            |  | 内服・その他内容                             |        |
|                   |   | 催吐リスク           |  |                                      |        |
|                   |   | 中               |  |                                      |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技              | 投与スケジュール   |                                      |        |
| ブスルファン            | 3.2mg/kg  | 3時間で点滴          | day1-4   |                                      |        |
| エトポシド             | 100mg/m <sup>2</sup>                                | 2時間で点滴 (12時間毎)  | day3,4,5(1回-2回-1回)                                     |                                      |        |
| シクロホスファミド         | 50mg/kg   | 2時間で点滴          | day5,6   |                                      |        |
| レジメン名             |   | Flu-Bu (Bu1日1回) |  | 癌種                                   | 移植前処置  |
| 解説<br>備考          | 造血幹細胞移植に対する移植前処置。ブスルフェクス1日1回投与法。                    | 1コース            |  | 内服・その他内容                             |        |
|                   |   | 催吐リスク           |  |                                      |        |
|                   | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与3日前から2日後までフェニトイン100mg3錠分3で投与。    | 中               |  |                                      |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技              | 投与スケジュール   |                                      |        |
| フルダラビン            | 30mg/m <sup>2</sup>                                 | 30分で点滴          | day1-6   |                                      |        |
| ブスルファン            | 3.2mg/kg  | 3時間で点滴          | day2-5   |                                      |        |
| レジメン名             |   | Bu4-CY (移植前処置)  |  | 癌種                                   | 移植前処置  |
| 解説<br>備考          | 造血幹細胞移植に対する汎用移植前処置。                                 | 1コース            |  | 内服・その他内容                             |        |
|                   |   | 6日              |  |                                      |        |
|                   | 痙攣に対する予防としてブスルファン投与2日前から2日後までフェニトイン100mg3錠分3で投与。    | 催吐リスク           | 高  |                                      |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技              | 投与スケジュール   |                                      |        |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg  | 120分で点滴         | day1-4   |                                      |        |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg  | 120分で点滴         | day1-4   |                                      |        |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg  | 120分で点滴         | day1-4   |                                      |        |
| ブスルファン            | 0.8mg/kg  | 120分で点滴         | day2-5   |                                      |        |
| シクロホスファミド         | 60mg/kg   | 120分で点滴         | day5-6   |                                      |        |
| レジメン名             |   | DLd 皮下注 未治療     |  | 癌種                                   | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考          | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                                     | 1コース            |  | 内服・その他内容                             |        |
|                   |   | 28日             |  | レナリドミド 25mg/body 経口 分1 day1-21       |        |
|                   | 過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・アセトアミノフェン・ファモチジン・ステロイド)を行う。 | 催吐リスク           | 軽  | デキサメタゾン 40mg/body 経口 分1 day1,8,15,22 |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技              | 投与スケジュール   |                                      |        |
| ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ | 1800mg/body   | 3-5分で皮下注        | C1-2day1,8,15,22<br>C3-6day1,15<br>C7-day1<br>(C=サイクル) |                                      |        |
| レジメン名             |   | Kd (多発性骨髄腫)     |  | 癌種                                   | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考          | 再発又は難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                             | 1コース            |  | 内服・その他内容                             |        |
|                   |   | 28日             |  | デキサメタゾン 20mg 経口分1                    |        |
|                   |   | 催吐リスク           | 軽  | day1,2,8,9,15,16,22,23               |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技              | 投与スケジュール   |                                      |        |
| カルフィルゾミブ          | 20mg/m <sup>2</sup>                                 | 30分で点滴          | 1サイクル目day1,2   |                                      |        |
| カルフィルゾミブ          | 56mg/m <sup>2</sup>                                 | 10分で点滴          | 1サイクル目day8,9,15,16<br>2サイクル目以降<br>day1,2,8,9,15,16     |                                      |        |

| レジメン名    |   | イサツキシマブ+DEX |  | 癌種 | 多発性骨髄腫 |
|----------|---|-------------|--|----|--------|
| 解説<br>備考 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                             | 1コース        | 内服・その他内容   |    |        |
|          |   | 28日         | デキサメタゾン 40mg/body 点滴（又は経口） 分1                          |    |        |
|          |   | 催吐リスク       | day1,8,15,22   |    |        |
|          |   | 軽           |  |    |        |
| 薬剤名      | 投与量   | 手技          | 投与スケジュール   |    |        |
| イサツキシマブ  | 20mg/kg   | 2-3時間で点滴    | C1day1,8,15,22<br>C2以降day1,15<br>(C=サイクル)              |    |        |
| レジメン名    |   | VRd (3投1休)  |  | 癌種 | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考 | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。3投1休で投与                              | 1コース        | 内服・その他内容   |    |        |
|          |   | 28日         | デキサメタゾン 20mg/body 経口分1 day1,2,8,9,15,16                |    |        |
|          |   | 催吐リスク       | レナリドミド 10mg/body 経口分1 day1-21                          |    |        |
|          |   | 最小          |  |    |        |
| 薬剤名      | 投与量   | 手技          | 投与スケジュール   |    |        |
| ボルテゾミブ   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                | 皮下注         | day1,8,15  |    |        |
| レジメン名    |   | DLd         |  | 癌種 | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考 | 再発または難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                            | 1コース        | 内服・その他内容   |    |        |
|          |   | 28日         | レナリドミド 25mg/body 経口分1 day1-21                          |    |        |
|          |   | 催吐リスク       | デキサメタゾン 20mg/body 経口分1 サイクル                            |    |        |
|          | 過敏感予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・アセトアミノフェン・ファモチジン・ステロイド)を行う。 | 軽           | 1,2day2,9,16,23 サイクル3-day2,8,9,16,22,23                |    |        |
| 薬剤名      | 投与量   | 手技          | 投与スケジュール   |    |        |
| ダラツムマブ   | 16mg/kg   | 点滴          | C1,2day1,8,15,22<br>C3-6day1,15<br>C7-day1<br>(C=サイクル) |    |        |
| レジメン名    |   | DBd         |  | 癌種 | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考 | 再発または難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                            | 1コース        | 内服・その他内容   |    |        |
|          |   | 21日         | デキサメタゾン 20mg/body 経口分1 サイクル1-3                         |    |        |
|          |   | 催吐リスク       | day2,4,5,9,11,12 サイクル4-8day2,4,5,8,9,11,12             |    |        |
|          | 9サイクル以降は28日   | 軽           |  |    |        |
| 薬剤名      | 投与量   | 手技          | 投与スケジュール   |    |        |
| ダラツムマブ   | 16mg/kg   | 点滴          | サイクル1-3day1,8,15                                       |    |        |
| ボルテゾミブ   | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                | 皮下注         | サイクル4-day1<br>day1,4,8,11                              |    |        |
| レジメン名    |   | イサツキシマブ+Kd  |  | 癌種 | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                             | 1コース        | 内服・その他内容   |    |        |
|          |   | 28日         | デキサメタゾン 20mg/body 点滴（又は経口） 分1                          |    |        |
|          |   | 催吐リスク       | day1,2,8,9,15,16,22,23                                 |    |        |
|          |   | 軽           |  |    |        |
| 薬剤名      | 投与量   | 手技          | 投与スケジュール   |    |        |
| イサツキシマブ  | 10mg/kg   | 2-3時間で点滴    | C1day1,8,15,22<br>C2以降day1,15                          |    |        |
| カルフィルゾミブ | 20mg/m <sup>2</sup>                                 | 30分で点滴      | C1day1,2   |    |        |
| カルフィルゾミブ | 56mg/m <sup>2</sup>                                 | 30分で点滴      | C1day8,9,15,16<br>C2以降day1,2,8,9,15,16                 |    |        |

| レジメン名                                |  | RVD lite (4投1休)        |     | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----|---|--------|
| 解説<br>備考                             | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。<br>10-15サイクル目では1コース28日とする                              | 1コース                   | 35日 | 内服・その他内容  |        |
|                                      |  | 催吐リスク                  | 最小  | レナリドミド 15mg/body 経口分1 day1-21<br>デキサメタゾン 40mg/body 経口分1 1-9サイクル目<br>day1,2,8,9,15,16,22,23 76歳以上 : day1,8,15,22 |        |
|                                      |  |                        |     |   |        |
| 薬剤名                                  | 投与量  | 手技                     |     | 投与スケジュール  |        |
| ボルテゾミブ                               | 1.3mg/m <sup>2</sup>   | 皮下注                    |     | day1,8,15,22<br>10-15サイクル目day1,15   |        |
| レジメン名                                |  | イサツキシマブ+Pd             |     | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                             | 再発又は難治性骨髄腫に対する抗腫瘍効果が認められるレジメンの一つ。                                      | 1コース                   | 28日 | 内服・その他内容  |        |
|                                      |  | 催吐リスク                  | 軽   | デキサメタゾン 40mg/body 経口分1 2C目以降day8,22<br>ポマリドミド 4mg/body 経口分1 day1-21<br>C=コース                                    |        |
|                                      |  |                        |     |   |        |
| 薬剤名                                  | 投与量  | 手技                     |     | 投与スケジュール  |        |
| イサツキシマブ (1コース目)<br>イサツキシマブ (2コース目以降) | 10mg/kg<br>10mg/kg   | 約2-3時間で点滴<br>約2-3時間で点滴 |     | day1,8,15,22<br>day1,15   |        |
| レジメン名                                |  | Once Weekly Kd         |     | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                             | 再発又は難治性の多発性骨髄腫の治療法の1つ。   | 1コース                   | 28日 | 内服・その他内容  |        |
|                                      |  | 催吐リスク                  | 軽度  | デキサメタゾン 40mg/body 経口分1 day1,8,15,22   |        |
|                                      |  |                        |     |   |        |
| 薬剤名                                  | 投与量  | 手技                     |     | 投与スケジュール  |        |
| カルフィルゾミブ<br>カルフィルゾミブ                 | 20mg/m <sup>2</sup><br>70mg/m <sup>2</sup>                             | 30分で点滴<br>30分で点滴       |     | 1C目day1<br>1C目day8,15,2C目1,8,15<br>C=サイクル   |        |
| レジメン名                                |  | エロツズマブ+Pd              |     | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                             | 再発又は難治性多発性骨髄腫の治療法のひとつ。   | 1コース                   | 28日 | 内服・その他内容  |        |
|                                      |  | 催吐リスク                  | 軽   | デキサメタゾン 28mg/body 経口分1 day1,8,15,22<br>ポマリドミド 4mg/body 経口分1 day1-21   |        |
|                                      |  |                        |     |   |        |
| 薬剤名                                  | 投与量  | 手技                     |     | 投与スケジュール  |        |
| エロツズマブ                               | 10mg/kg  | 約2-3時間で点滴              |     | 1,2C目day1,8,15,22<br>3C目以降day1<br>C=サイクル  |        |
| レジメン名                                |  | DLd 皮下注 2nd以降          |     | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                             | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。<br>過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・アセトアミノフェン・ファモチジン・ステロイド)を行う。 | 1コース                   | 28日 | 内服・その他内容  |        |
|                                      |  | 催吐リスク                  | 軽   | レナリドミド 25mg/body 経口分1 day1-21<br>デキサメタゾン 20mg/body/週 経口分1<br>day1,2,8,9,15,16,22,23                             |        |
|                                      |  |                        |     |   |        |
| 薬剤名                                  | 投与量  | 手技                     |     | 投与スケジュール  |        |
| ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ                    | 1800mg/body  | 3-5分で皮下注               |     | C1-2day1,8,15,22<br>C3-6day1,15<br>C7-day1<br>(C=サイクル)  |        |

|                   |                            |             |  |        |
|-------------------|----------------------------|-------------|--|--------|
| レジメン名             | <b>KRd (再発又は難治性多発性骨髄腫)</b> |             | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 再発又は難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。    | 1コース        | 内服・その他内容<br>レナリドミド 25mg/body 経口 分1 day1-21<br>デキサメタゾン 40mg/body 経口 分1 day1,8,15,22 |        |
|                   |                            | 28日         |  |        |
|                   |                            | 催吐リスク<br>軽  |  |        |
| 薬剤名               | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール   |        |
| カルフィルゾミブ          | 20mg/m <sup>2</sup>        | 30分で点滴      | 1サイクル目day1,2   |        |
| カルフィルゾミブ          | 27mg/m <sup>2</sup>        | 30分で点滴      | 2-12サイクル目<br>day1,2,8,9,15,16<br>13サイクル目以降<br>day1,2,15,16                         |        |
| レジメン名             | <b>DPd 皮下注</b>             |             | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 再発又は難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。    | 1コース        | 内服・その他内容<br>ポマリドミド 4mg/body 経口 分1 day1-21<br>デキサメタゾン 40mg/body 経口 分1 day1,8,15,22  |        |
|                   |                            | 28日         |  |        |
|                   |                            | 催吐リスク<br>軽  |  |        |
| 薬剤名               | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール   |        |
| ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ | 1800mg/body                | 3-5分で皮下注    | C1-2day1,8,15,22<br>C3-6day1,15<br>C7-day1<br>(C=サイクル)                             |        |
| レジメン名             | <b>イサツキシマブ単独</b>           |             | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 再発又は難治性の多発性骨髄腫の治療法のひとつ。    | 1コース        | 内服・その他内容   |        |
|                   |                            | 28日         |  |        |
|                   |                            | 催吐リスク<br>軽  |  |        |
| 薬剤名               | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール   |        |
| イサツキシマブ           | 20mg/kg                    | 2-3時間で点滴    | C1day1,8,15,22<br>C2以降day1,15<br>(C=サイクル)  |        |
| レジメン名             | <b>VTD (静注)</b>            |             | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 多発性骨髄腫に対する化学療法。            | 1コース        | 内服・その他内容<br>デキサメタゾン 20mg 経口 分1 day1,8,15<br>サリドマイド 50mg 経口 分1 day1-21              |        |
|                   |                            | 28日         |  |        |
|                   |                            | 催吐リスク<br>最小 |  |        |
| 薬剤名               | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール   |        |
| ボルテゾミブ            | 1.3mg/m <sup>2</sup>       | 静注          | day1,8,15  |        |
| レジメン名             | <b>ボルテゾミブ 静注 週1</b>        |             | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。           | 1コース        | 内服・その他内容<br>デキサメタゾン 20mg 経口 分1 day2,9,16   |        |
|                   |                            | 21日         |  |        |
|                   |                            | 催吐リスク<br>最小 |  |        |
| 薬剤名               | 投与量                        | 手技          | 投与スケジュール   |        |
| ボルテゾミブ            | 1.3mg/m <sup>2</sup>       | 静注          | day1,8,15  |        |

|          |  |                         |       |                                     |                  |
|----------|--|-------------------------|-------|-------------------------------------|------------------|
| レジメン名    |  | ボルテゾミブ 皮下注 週1           |       | 癌種                                  | 多発性骨髄腫           |
| 解説<br>備考 | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。静注と比較し、効果は同等であり副作用発現が低減するとされている。 |                         | 1コース  | 内服・その他内容                            |                  |
|          |  |                         | 35日   |                                     |                  |
|          |  |                         | 催吐リスク |                                     |                  |
|          |  | 最小                      |       |                                     |                  |
| 薬剤名      |  | 投与量                     |       | 手技                                  | 投与スケジュール         |
| ボルテゾミブ   |  | 1.3mg/m <sup>2</sup>    |       | 皮下注                                 | 1,8,15,22        |
| レジメン名    |  | CBD (再発・難治性多発性骨髄腫)      |       | 癌種                                  | 多発性骨髄腫           |
| 解説<br>備考 | 再発・難治性多発性骨髄腫に対する治療法。                             |                         | 1コース  | 内服・その他内容                            |                  |
|          |  |                         | 28日   | シクロホスファミド 50mg 経口 分1 day1-21        |                  |
|          |  |                         | 催吐リスク |                                     |                  |
|          |  | 最小                      |       |                                     |                  |
| 薬剤名      |  | 投与量                     |       | 手技                                  | 投与スケジュール         |
| デキサメタゾン  |  | 3.3-33mg/m <sup>2</sup> |       | 30分で点滴                              | day1,2,8,9,15,16 |
| ボルテゾミブ   |  | 1.3mg/m <sup>2</sup>    |       | 静注                                  | day1,8,15        |
| レジメン名    |  | CBD 皮下注                 |       | 癌種                                  | 多発性骨髄腫           |
| 解説<br>備考 | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。                                 |                         | 1コース  | 内服・その他内容                            |                  |
|          |  |                         | 28日   | デキサメタゾン 20mg 経口 分1 day1,2,8,9,15,16 |                  |
|          |  |                         | 催吐リスク | シクロホスファミド 50mg 経口 分1 day1-21        |                  |
|          |  | 最小                      |       |                                     |                  |
| 薬剤名      |  | 投与量                     |       | 手技                                  | 投与スケジュール         |
| ボルテゾミブ   |  | 1.3mg/m <sup>2</sup>    |       | 皮下注                                 | day1,8,15        |
| レジメン名    |  | 低用量VTD 皮下注              |       | 癌種                                  | 多発性骨髄腫           |
| 解説<br>備考 | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。                                 |                         | 1コース  | 内服・その他内容                            |                  |
|          |  |                         | 28日   | デキサメタゾン 20mg 経口 分1 day1,8,15        |                  |
|          |  |                         | 催吐リスク | サリドマイド 50mg 経口 分1 day1-21           |                  |
|          |  | 最小                      |       |                                     |                  |
| 薬剤名      |  | 投与量                     |       | 手技                                  | 投与スケジュール         |
| ボルテゾミブ   |  | 1.3mg/m <sup>2</sup>    |       | 皮下注                                 | day1,8,15        |
| レジメン名    |  | VAD (多発性骨髄腫)            |       | 癌種                                  | 多発性骨髄腫           |
| 解説<br>備考 | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。                                 |                         | 1コース  | 内服・その他内容                            |                  |
|          |  |                         | 28日   |                                     |                  |
|          |  |                         | 催吐リスク |                                     |                  |
|          |  | 軽                       |       |                                     |                  |
| 薬剤名      |  | 投与量                     |       | 手技                                  | 投与スケジュール         |
| ドキシソルピシン |  | 9mg/m <sup>2</sup>      |       | 24時間で点滴                             | day1-4           |
| ビンクリスチン  |  | 0.4mg/body              |       | 24時間で点滴                             | day1-4           |

| レジメン名                       | ボルテゾミブ 皮下注 週2  |                 | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
|-----------------------------|--|-----------------|--|--------|
| 解説<br>備考                    | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。静注と比較し、効果は同等であり副作用発現が低減するとされている。                       | 1コース            | 内服・その他内容   |        |
|                             |  | 21日             |  |        |
|                             |  | 催吐リスク<br>最小     |  |        |
| 薬剤名                         | 投与量  | 手技              | 投与スケジュール   |        |
| ボルテゾミブ                      | 1.3mg/m <sup>2</sup>   | 皮下注             | 1,4,8,11   |        |
| レジメン名                       | DBd 皮下注  |                 | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                    | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。<br>過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・アセトアミノフェン・ファモチジン・ステロイド)を行う。 | 1コース            | 内服・その他内容   |        |
|                             |  | 28日             |  |        |
|                             |  | 催吐リスク<br>軽      |  |        |
| 薬剤名                         | 投与量  | 手技              | 投与スケジュール   |        |
| ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ<br>ボルテゾミブ | 1800mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup>                                    | 3-5分で皮下注<br>皮下注 | C1-3day1,8,15,C4-day1<br>C1-8day1,4,8,11<br>(C=サイクル)                       |        |
| レジメン名                       | MEL  |                 | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                    | 多発性骨髄腫の標準的な自家移植前処置の1つ。   | 1コース            | 内服・その他内容   |        |
|                             |  | 催吐リスク<br>中      |  |        |
|                             |  |                 |  |        |
| 薬剤名                         | 投与量  | 手技              | 投与スケジュール   |        |
| メルファラン                      | 100mg/m <sup>2</sup>   | 60分で点滴          | day1,2   |        |
| レジメン名                       | ボルテゾミブ 静注 週2   |                 | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                    | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。   | 1コース            | 内服・その他内容<br>デキサメタゾン 20mg 経口 分1 day2,9,16                                   |        |
|                             |  | 24日             |  |        |
|                             |  | 催吐リスク<br>最小     |  |        |
| 薬剤名                         | 投与量  | 手技              | 投与スケジュール   |        |
| ボルテゾミブ                      | 1.3mg/m <sup>2</sup>   | 静注              | day1,4,8,11  |        |
| レジメン名                       | VTD-PACE   |                 | 癌種   | 多発性骨髄腫 |
| 解説<br>備考                    | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。  | 1コース            | 内服・その他内容<br>サリドマイド 200mg/body 経口分1 day1-4<br>デキサメタゾン 40mg/body 経口分1 day1-4 |        |
|                             |  | 21日             |  |        |
|                             |  | 催吐リスク<br>高      |  |        |
| 薬剤名                         | 投与量  | 手技              | 投与スケジュール   |        |
| ボルテゾミブ                      | 1mg/m <sup>2</sup>   | 皮下注             | day1,4,8,11  |        |
| シスプラチン                      | 10mg/m <sup>2</sup>  | 24時間持続静注        | day1-4   |        |
| ドキシソルビシン                    | 10mg/m <sup>2</sup>  |                 |  |        |
| シクロホスファミド                   | 400mg/m <sup>2</sup>   |                 |  |        |
| エトポシド                       | 40mg/m <sup>2</sup>  | 24時間持続静注        | day1-4   |        |



| レジメン名             | VRD 寛解 (多発性骨髄腫)                                     |          | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
|-------------------|---|----------|---|--------|
| 解説備考              | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                                     | 1コース     | 内服・その他内容  |        |
|                   |   | 21日      | レナリドミド 25mg/body 経口 分1 day1-21                                |        |
|                   |   | 催吐リスク    | デキサメタゾン 【※】 経口 分1 day1,8,15,22                                |        |
|                   |   | 最小       | ※：デキサメタゾンは(1-4コース目)40mg/body,                                 |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール  |        |
| ボルテゾミブ            | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                | 皮下注      | day1,4,8,11   |        |
| レジメン名             | VRD 維持 (多発性骨髄腫)                                     |          | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。VRD寛解療法8コース後奏効患者に対して維持療法を行う。         | 1コース     | 内服・その他内容  |        |
|                   |   | 21日      | レナリドミド 25mg/body 経口 分1 day1-14                                |        |
|                   |   | 催吐リスク    | デキサメタゾン 12mg/body 経口 分1 day1,2,8,9                            |        |
|                   |   | 軽        |   |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール  |        |
| ボルテゾミブ            | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                | 皮下注      | day1-8  |        |
| レジメン名             | ERd   |          | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 再発又は難治性多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                              | 1コース     | 内服・その他内容  |        |
|                   |   | 28日      | レナリドミド 25mg/body 経口 分1 day1-21                                |        |
|                   |   | 催吐リスク    | デキサメタゾン 28mg/body 経口 分1 1-2サイクル目 day1,8,15,22 3サイクル目以降day1,15 |        |
|                   |   | 軽        |   |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール  |        |
| エロツズマブ            | 10mg/kg   | 2-3時間で点滴 | 1,2サイクル目 day1,8,15,22<br>3サイクル目以降day1,15                      |        |
| レジメン名             | 高用量VTD 皮下注  |          | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 多発性骨髄腫の標準的治療の1つ。                                    | 1コース     | 内服・その他内容  |        |
|                   |   | 21日      | デキサメタゾン 40mg 経口 分1 day1-4,9-12                                |        |
|                   |   | 催吐リスク    | サリドマイド 100mg 経口 分1 day1-21                                    |        |
|                   |   | 軽        |   |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール  |        |
| ボルテゾミブ            | 1.3mg/m <sup>2</sup>                                | 皮下注      | dat1,4,8,11   |        |
| レジメン名             | DCd 皮下注   |          | 癌種  | 多発性骨髄腫 |
| 解説備考              | 多発性骨髄腫の治療法のひとつ。                                     | 1コース     | 内服・その他内容  |        |
|                   |   | 28日      |   |        |
|                   | 過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・アセトアミノフェン・ファモチジン・ステロイド)を行う。 | 催吐リスク    |   |        |
|                   |   | 軽        |   |        |
| 薬剤名               | 投与量   | 手技       | 投与スケジュール  |        |
| ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ | 1800mg/body   | 3-5分で皮下注 | C1-2day1,8,15,22<br>C3-6day1,15,C7-day                        |        |
| カルフィルゾミブ          | 20mg/m <sup>2</sup>                                 | 30分で点滴   | C1day1,2  |        |
| カルフィルゾミブ          | 56mg/m <sup>2</sup>                                 | 30分で点滴   | C1day8,9,15,16<br>C2以降1,2,8,9,15,16                           |        |

|       |                                  |       |                     |          |     |          |        |
|-------|----------------------------------|-------|---------------------|----------|-----|----------|--------|
| レジメン名 | 【臨】 JALSG MDS212 アザシチジン 5日間（皮下注） |       | 癌種                  | 骨髓異形成症候群 |     |          |        |
| 解説備考  | 骨髓異形成症候群（MDS）の標準的治療の1つ。          | 1コース  | 内服・その他内容            |          |     |          |        |
|       |                                  | 28日   |                     |          |     |          |        |
|       |                                  | 催吐リスク |                     |          |     |          |        |
|       |                                  | 中     |                     |          |     |          |        |
| 薬剤名   | アザシチジン                           | 投与量   | 75mg/m <sup>2</sup> | 手技       | 皮下注 | 投与スケジュール | day1-5 |

|       |                                   |       |                     |          |        |          |        |
|-------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------|--------|----------|--------|
| レジメン名 | 【臨】 JALSG MDS212 アザシチジン 5日間（点滴静注） |       | 癌種                  | 骨髓異形成症候群 |        |          |        |
| 解説備考  | 骨髓異形成症候群（MDS）の標準的治療の1つ。           | 1コース  | 内服・その他内容            |          |        |          |        |
|       |                                   | 28日   |                     |          |        |          |        |
|       |                                   | 催吐リスク |                     |          |        |          |        |
|       |                                   | 中     |                     |          |        |          |        |
| 薬剤名   | アザシチジン                            | 投与量   | 75mg/m <sup>2</sup> | 手技       | 10分で点滴 | 投与スケジュール | day1-5 |

|       |                         |       |                     |          |     |          |        |
|-------|-------------------------|-------|---------------------|----------|-----|----------|--------|
| レジメン名 | アザシチジン皮下注（骨髓異形成症候群）     |       | 癌種                  | 骨髓異形成症候群 |     |          |        |
| 解説備考  | 骨髓異形成症候群（MDS）の標準的治療の1つ。 | 1コース  | 内服・その他内容            |          |     |          |        |
|       |                         | 28日   |                     |          |     |          |        |
|       |                         | 催吐リスク |                     |          |     |          |        |
|       |                         | 中     |                     |          |     |          |        |
| 薬剤名   | アザシチジン                  | 投与量   | 75mg/m <sup>2</sup> | 手技       | 皮下注 | 投与スケジュール | day1-7 |

|       |                         |       |                     |          |        |          |        |
|-------|-------------------------|-------|---------------------|----------|--------|----------|--------|
| レジメン名 | アザシチジン点滴静注（骨髓異形成症候群）    |       | 癌種                  | 骨髓異形成症候群 |        |          |        |
| 解説備考  | 骨髓異形成症候群（MDS）の標準的治療の1つ。 | 1コース  | 内服・その他内容            |          |        |          |        |
|       |                         | 28日   |                     |          |        |          |        |
|       |                         | 催吐リスク |                     |          |        |          |        |
|       |                         | 中     |                     |          |        |          |        |
| 薬剤名   | アザシチジン                  | 投与量   | 75mg/m <sup>2</sup> | 手技       | 10分で点滴 | 投与スケジュール | day1-7 |

|       |                                    |       |  |          |                     |          |                   |
|-------|------------------------------------|-------|--|----------|---------------------|----------|-------------------|
| レジメン名 | CAG（骨髓異形成症候群(MDS)及びMDS由来急性骨髓性白血病）  |       | 癌種   | 骨髓異形成症候群 |                     |          |                   |
| 解説備考  | 骨髓異形成症候群（MDS）及びMDS由来急性骨髓性白血病の標準治療。 | 1コース  | 内服・その他内容                                   |          |                     |          |                   |
|       |                                    | 14日   |  |          |                     |          |                   |
|       |                                    | 催吐リスク |  |          |                     |          |                   |
|       |                                    | 軽     |  |          |                     |          |                   |
| 薬剤名   | シタラビン<br>アクリラルビシン                  | 投与量   | 10mg/m <sup>2</sup><br>14mg/m <sup>2</sup> | 手技       | 12時間毎に皮下注<br>30分で点滴 | 投与スケジュール | day1-14<br>day1-4 |

|       |                             |                      |   |   |
|-------|-----------------------------|----------------------|---|---|
| レジメン名 | DcyBorD                     |                      | 癌種  | 全身性ALアミロイドーシス                           |
| 解説    | 全身性ALアミロイドーシスに対し効果が認められるため。 | 1コース                 | 内服・その他内容  |   |
|       |                             | 28日                  | シクロホスファミド 300mg/m <sup>2</sup> 経口 分1 C1-6day1,8,15,22 |   |
| 備考    |                             | 催吐リスク                | 軽   |   |
|       |                             | 軽                    | デキサメタゾン 20mg/body 経口 分1 C1-                           |   |
|       | 薬剤名                         | 投与量                  | 手技  | 投与スケジュール                                |
|       | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ           | 1800mg/body          | 3-5分で皮下注  | C1,2day1,8,15,22<br>C3-6day1,15 C7-day1 |
|       | ボルテゾミブ                      | 1.3mg/m <sup>2</sup> | 皮下注   | C1-6day1,8,15,22<br>(C=サイクル)            |