

## 皮膚

レジメン名		6週毎 ペムブロリズマブ (悪性黒色腫)		癌種	悪性黒色腫
解説	悪性黒色腫に対する治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		42日			
備考	術後療法の場合投与期間は12ヶ月まで。	催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ペムブロリズマブ	400mg/body	30分で点滴	day1		
レジメン名		ペムブロリズマブ (悪性黒色腫)		癌種	悪性黒色腫
解説	悪性黒色腫の治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ペムブロリズマブ	200mg/body	30分で点滴	day1		
レジメン名		ニボルマブ (悪性黒色腫)		癌種	悪性黒色腫
解説	化学療法未治療・既治療の根治切除不能な悪性黒色腫	1コース	内服・その他内容		
		14日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ニボルマブ	240mg/body	30分で点滴	day1		
レジメン名		ニボルマブ+イピリムマブ (悪性黒色腫)		癌種	悪性黒色腫
解説	根治切除不能な悪性黒色腫の治療法	1コース	内服・その他内容		
		21日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ニボルマブ イピリムマブ	80mg/body 3mg/kg	30分で点滴 90分で点滴	day1 day1		

レジメン名		<b>イピリムマブ</b>		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	根治切除不能な悪性黒色腫の治療法		1コース	内服・その他内容	
			21日		
			催吐リスク		
			最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
イピリムマブ		3mg/kg	90分で点滴	day1	
レジメン名		<b>低用量ニボルマブ</b>		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	化学療法既治療の根治切除不能な悪性黒色腫		1コース	内服・その他内容	
			21日		
			催吐リスク		
			最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ニボルマブ		2mg/kg	60分で点滴	day1	
レジメン名		<b>ダカルバジン</b>		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	悪性黒色腫に対するレジメン		1コース	内服・その他内容	
			21日		
			催吐リスク		
			高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ダカルバジン		1000mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1	
レジメン名		<b>DAV-Feron (悪性黒色腫)</b>		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	悪性黒色腫の標準的治療の1つ。		1コース	内服・その他内容	
			28日		
			催吐リスク		
			高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ニムスチン		60mg/m <sup>2</sup>	30分で点滴	day1	
ビンクリスチン		0.6mg/m <sup>2</sup>	10分で点滴	day1	
ダカルバジン		120mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1-5	
インターフェロンベータ		300万単位	皮下注	day1-5	
レジメン名		<b>4週毎 ニボルマブ (悪性黒色腫)</b>		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	化学療法未治療・既治療の根治切除不能な悪性黒色腫		1コース	内服・その他内容	
			28日		
			催吐リスク		
			最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴	day1	

レジメン名	アベルマブ (メルケル細胞腫)		癌種	メルケル細胞腫
解説	メルケル細胞腫の治療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考	アベルマブ投与30分前にジフェンヒドラミン10mg×5錠、アセトアミノフェン300mg×2錠を投与する。	催吐リスク		
		最小		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
アベルマブ	10mg/kg	60分で点滴	day1	
レジメン名	デニロイキン ジフチトクス		癌種	皮膚T細胞性リンパ腫、未梢性T細胞リン
解説	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫、再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
デニロイキン ジフチトクス	9µg/kg	60分で点滴	day1-5	