近大奈良病院　がん化学療法レジメン一覧

脳腫瘍

レジメン名	ベバシズマブBS療法3週毎（15mg/kg）	癌種	悪性神経膠腫
解説	再発悪性神経膠腫に対するレジメン	1コース	内服・その他内容
		21日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ	15mg/kg	30～90分	day1

レジメン名	ベバシズマブBS療法2週毎（10mg/kg）	癌種	悪性神経膠腫
解説	再発悪性神経膠腫に対するレジメン	1コース	内服・その他内容
		14日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ	10mg/kg	30～90分	day1

レジメン名	Triweekly BV（悪性神経膠腫）	癌種	悪性神経膠腫
解説	悪性神経膠腫に対するレジメン。	1コース	内服・その他内容
		21日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ	15mg/kg	30-90分で点滴	day1

レジメン名	Biweekly BV（悪性神経膠腫）	癌種	悪性神経膠腫
解説	悪性神経膠腫に対するレジメン。	1コース	内服・その他内容
		14日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ	10mg/kg	30-90分で点滴	day1