近大奈良病院　がん化学療法レジメン一覧

MSI-Highを有する固形癌

レジメン名	**4週毎 ニボルマブ（MSI-High大腸癌）**	癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	MSI-Highを有する結腸・直腸癌の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容
		28日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ	480mg/body	30分で点滴	day1

レジメン名	**6週毎 ペムブロリズマブ（MSI-High大腸癌）**	癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	MSI-Highを有する固形癌の治療法の一つ。	1コース	内服・その他内容
		42日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ	400mg/body	30分で点滴	day1

レジメン名	**ニボルマブ+イピリムマブ（MSI-High大腸癌）**	癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌に適応が追加されたため。	1コース	内服・その他内容
		21日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ	240mg/body	30分で点滴	day1
イピリムマブ	1mg/kg	30分で点滴	day1

レジメン名	**ペムブロリズマブ（MSI-High）**	癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	MSI-Highを有する固形癌の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容
		21日	
備考		催吐リスク	
		最小	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ	200mg/body	30分で点滴	day1